

Perccottus glenii - Amuri küllő

ELSŐ LEÍRÓJA:	Dybowski, 1877
CSALÁD:	Odontobutidae
MÉRET:	15-25 cm
C°:	13-20
pH°:	7,0-8,0
Nk°:	8-12
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	területvédő
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	4-7 év
TERM.VÉD.:	



Perccottus glenii

Amuri küllő

(Dybowski, 1877)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon roseus – Sárga fantomlazac elterjedési területe (Map)

Ázsiából, az Amur vidékéről származó hidegvízi hal. Itt az Amur középső és alsó folyása mentén, valamint a Primorje-vidék folyóiban él. Ezenkívül Európában, Északkelet-Kínában és Koreában is előfordul.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test zömök, bunkó alakú. Keresztmetszete kerekded, csak a test vége felé oldalt erősebben lapított. A homlok meredeken emelkedik, a hát szinte teljesen egyenes. A száj nagy, a szájrés ferdén felfelé irányul. A mellúszók nagyok és legyező alakúak.

Hosszúság: 24 cm-ig, ezt azonban akváriumban nem nagyon éri el.

Sárgásbarna alapon számos sötétebb, márványos folt látható, amelyek a hímen erőteljesebbek, mint a nőstényen. A színezet a környezettől és az izgalmi állapottól függően változik. A hím hátúszójának első tövise előre áll, a nőstényé viszont függőlegesen fölfelé mutat. A hímek ezenkívül egészükben is erőteljesebbek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj 1969-ben Kelet-Németországban bukkant fel az importált amurok és busák között, majd nem sokkal később hazai folyóinkban is megjelent. Sajnos a Tiszán történt cián szennyeződést követően, a ragadozóhalak pusztulása miatt túlszaporodott.

Hideg-vízű akváriumban egészen jól tartható és szaporodik is. Jó nagy, kövekből és gyökerekből összeállított rejtekhelyes akváriumokat igényel. Ajánlatos erőteljes szellőztetés. A víz hőmérséklete lehetőleg ne legyen magasabb 20 C°-nál. Az amuri küllő igen falánk és tápdús élőleleségre (földigiliszta, szúnyoglárva, Tubifex, apró halak, vagy ezek pótlására emlősök és madarak sovány húsa) van szüksége.

Kellő etetéssel tenyésztése nem nehéz. A hím ívási idején kívül is bizonyos reviereket száll meg, amelyeket fenyegető mozdulatokkal és (az ultrahangok tartományába eső) fenyegető hangokkal védelmez. Az ívási előkészületekhez már 15 C° hőmérsékleten hozzáfog. A későbbi költőhelyet a hím tisztogatja meg; az ivásra még nem hajlamos nőstényt alaposan megkergeti. A kopoltyúfedők nyitogatásával, az úszók kifeszítésével, reszketéssel és a fark-úszó csapkodásával udvarol, miközben teste egy szempillantás alatt sötétté válik, s a gyöngyházzsínű oldalsó foltok erőteljesen láthatókká lesznek.

Az ikrákat szilárd aljzatra 3- 8 óra alatt rakja le. Számuk elérheti a 300-at. Színük barnás, átmérőjük 1 mm, s apró nyélen ülnek. Ivadékgondozást csak a hím végez, a nőstényt elkergeti a költőhelyről. Az ivadékok 16 C° hőmérsékleten kb. 21 nap múlva bújnak ki. 4-5 napon át szikzacskójukból élnek, utána hajlandók élő poreleséget elfogadni. A hím egészen az elúszásig őrzi őket, utána azonban nem törődik többé velük.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Eleotris dybowskii*, *Eleotris pleskei*, *Percottus glehni*, *Percottus glehni*, *Percottus pleskei*.

Eng: Amur sleeper, Chinese sleeper.

Egyéb köznevei: Rohmutokko, Chinesische Schläfergrundel, Goloweschka, Trawianka, головешка-потан, Goloveshka, Goloweschka.

KATEGÓRIÁK:

[Hazai halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Odontobutidae](#), [Perccottus glenii](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1877](#), [Hazai halfajták](#), [Amuri küllő](#), [Dybowski](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-04-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-09 08:41:47

Katalógus ID: 4341

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/hazai-halak/percottus-glenii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva