

Phenacogrammus interruptus - Kongólazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1899
CSALÁD:	Alestidae
MÉRET:	7-10 cm
C°:	23-26
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5-19
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és felső szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Phenacogrammus interruptus

Kongólazac
(Boulenger, 1899)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Phenacogrammus interruptus – Kongólazac elterjedési területe (Map)

A Kongó-medence.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Mérsékelten nyúlánk, oldalt igen lapított, a test körvonala hosszúkásan tojásdad. Szemei feltűnően nagyok. Az úszók - főként a híméi — erősen megnyúltak, s a farkúszó középső része lebenyszerű csücsköt alkot. A hím 8 cm-ig, a nőstény 6 cm-ig nőhet.

Ezüstösen ragyogó, s halvány színes és fénylő tónusok láthatók rajta. Az úszók szürkés lilák, a szélük fehér. A hím farkés hátúszója nagyon megnyúlt. Az úszók porcelánfehér szegélye különösen a fiatal hímeken feltűnő.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Eleven és békés rajhal.

Társas tartásra igen alkalmas. Főként ráeső fényben érvényesül szépen. Tágas kiúszóteret igényel, de kellően sűrű növényzetre is szüksége van, hogy időnként visszahúzódhasson. Minél lágyabb, tenyésztéskor feltétlenül tőzegen átszűrt vízben tartsuk; de nagyobb keménységi fokokat is kibír. A hőmérséklet 23—25 C° körül legyen, tenyésztéskor is. Bármilyen élő- és szárazelelességgel etethető, de az utóbbi önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megkezdje az ívást. Táplálékát elsősorban a felszínről fogyasztja.

Tenyésztése közepesen nehéz. Vízüket tőzegen át szűrjük át. A siker fontos előfeltétele a nagy és hosszú medence, továbbá mészben szegény, azonban sókban gazdag víz. A táplálékukhoz kiegészítésül rendszeresen kell adni repülő rovar, pókot, Drosophilát stb.

Meglehetősen nagy ikráit a fenék közelébe, növények közé rakja; ezek nem ragadósak. Noha a szülők látszólag nem nagy ikrarablók, mégis ajánlatos az eltávolításuk. Az ikrák száma elérheti a 400—500-at. Az ivadékok hat nap múlva bújnak ki, 24—36 óra elteltével már szabadon úszkálnak, s azonnal esznek *Cyclops*- és *Artemia*-naupliusokat. Felnevelésük ezután már nem nehéz.

A hímek sokkal színesebbek a nőstényeknél. Kedveli az erősebben szűrt vizet. Rettenetesen szép, csodálatra méltó halak, rajban kell tartani őket! Minden kongói akvárium ékkövei, az ilyen típusú medencék "kötelező" hala!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Alestopetersius interruptus*, *Hemigrammalestes interruptus*, *Micralestes interruptus*.

Eng: Congo tetra.

Egyéb köznevei: Tetra Konžská, Tétro du Congo, Kongozalm, Świecik kongijski, Tetra del Congo, Almindelig congotetra, Kongontetra, Kongosalmmler, Świecik kongijski, Kongotetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Kongólazac](#), [Phenacogrammus interruptus](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1899](#), [Alestidae](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [békés rajhal](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú](#)

[életű 6 év fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [Kongó](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [Közép-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-08-07 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 07:07:22

Katalógus ID: 4346

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/phenacogrammus-interruptus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva