Polypterus ornatipinnis - Gyöngyfoltos sokúszós csuka

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1902
CSALÁD:	Polypteridae
MÉRET:	35-60 cm
C°:	26-28
pH°:	7,0-8,0
Nk°:	10-18
HELYIGÉNY:	400 liter
VISELKEDÉS:	nem társas hal
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-15 év
TERM.VÉD.:	



Polypterus ornatipinnis
Gyöngyfoltos sokúszós csuka
(Boulenger, 1902)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:









A Kongó középső és felső folyásának környékén.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A testet vastag, rombusz alakú pikkelyek borítják, amelyeket vastag zománcréteg fed. A hátúszó számos, egy-egy tövis által tartott úszócskára oszlik, amelyek csak izgalmi állapotban egyenesednek ki. A mellúszók nyélszerű tengelyen állnak. Az úszóhólyag két részes, járulékos légzőszervként szolgál. Ez a család az egyetlen, amelynek úszóhólyagját a garattal járat köti össze. Az orrlyukak csőszerűen meghosszabbodtak.

10-11 úszója van. Hosszúsága kb. 35 (45) cm. Az alapszín fehéres- vagy szürkéssárga, amely a test vége felé élénksárgára változik. A fejen, a testen és az úszókon szabálytalan, de összefüggő rajzolatból álló,

sötét hálóminta látható, amely különösen a szép sárga úszókon érvényesül jól. A hím fark alatti úszója jóval nagyobb a nőstényénél, alapszíne ívás idején élénksárga. A nőstény határozottan teltebb a hímnél, feje szélesebb, színezete elmosódottabb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Érdekes halak, amelyeknek kisebb példányai szobaakváriumba is megfelelnek, egyébként csak nagyobb nyilvános akváriumokba valók. Szívesen heverésznek a fenéken, lábszerű mellúszóikra támaszkodva, amelyek segítségével szinte futva is tudnak mozogni. Noha lustáknak látszanak, levegő vételekor, vagy más okból nagyon ügyesen tudnak úszni is. Ragadozó halak lévén csak darabos élőeleséget, a legszívesebben halakat, békákat, vagy emlősök, madarak húsát fogyasztják. Az orron levő ~~tapogató~~ nyúlvány a táplálék felkutatására szolgál.

A természetben való szaporodásról keveset tudunk. Az ívási periódus valószínűleg az esős évszakra esik, amikor nagy területek kerülnek víz alá. Valószínű, hogy nem gondozzák ivadékaikat, hanem az ikrákat egyszerűen vízinövényekre stb. ragasztják.

Akváriumban való tenyésztéséhez bőséges és változatos táplálás mellett nagy méretű tartályra is szükség van. A víz hőmérsékletét 28 °C-ra állítsuk be, majd több napon át végezzünk 26 °C-os vízzel 50 %-os vízcserét. Ilyenkor a hím hevesen kezdi el kergetni a nőstényt, mely eleinte ellenáll az udvarlásnak, majd meggondolva magát elhelyezik 2 mm-es sötét színű ikráikat a legkülönfélébb helyekre: növények leveleire, gyökerek közé de akár a homokba is. Az udvarlásról alább láthatunk videót.

Az ivadékok eleinte külső kopoltyúkat viselnek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Polypterus weeksii*.

Eng: Ornate bichir.

Egyéb köznevei: Mimbambala, Mumbambala, Tshikanga, Bichir pruhoploutvý, Bichir zdobený, Plettet bikir, Kirjoniilinhauki, Konga, Mukunga, Mukungo, Nkunga ya moja batu, Samaki magamba.

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Egyéb édesvízi halak

KULCSSZAVAK:

Akváriumi halak, akvarisztika, 1902, Boulenger, Egyéb ikrarakó halak, Gyöngyfoltos sokúszós csuka, Polypteridae, Polypterus ornatipinnis

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2011-04-09 09:01:17
Legutolsó frissítés: 2012-01-31 13:08:03
Katalógus ID: 4342
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/polypterus-ornatipinnis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva