

Prionobrama filigera - Törpe üveglazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Cope, 1870
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23,0-27,0
pH°:	6.0-7.8
Nk°:	?-30
HELYIGÉNY:	90 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Prionobrama filigera

Törpe üveglazac

(Cope, 1870)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!



Prionobrama filigera – Törpe üveglazac elterjedési területe (Map)

Brazília, Amazonas-medence, a Madeira folyó vízgyűjtője.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az áramvonalas kis hal nagyon hasonlít a pirosszárnyú pontylazachoz. Áttetsző, kékesszürke színű. A hímek has-úszója és széles alapon nyugvó farok alatti úszójának elülső sugarai hosszúak. A hím farokúszója sötétvörös, míg a nősténynek csak egy vörös terület van a farokúszója tövén.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony hal, rajokban úszik a lebegő növényzet alatt vagy a szűrő áramában. Lágymű vízben könnyen

szaporodik. Az íváshoz csoportosan rakjuk át halainkat, fele-fele arányban (kb. 6 példányt) egy 18X10X10 cm-es, pH6,0-7,0, nK 1-5, 26-29 °C-os, finomlevelű növényekkel berendezett medencébe. Ikrarács szükséges. Szűrés nem életfontosságú, de egy kis levegő-meghajtású szivacs filter légporkasztóval finomra állítva nem káros, és egyben jó forrása olyan mikro-szervezeteknek, melyet az ivadék szívesen leleget. Alternatív megoldásként lehet párban is ívatni. A szülők ikrarablók, amint észleltük az ívás befejezését, távolítsuk el őket. Az ikrák 14-36 óra múlva kelnek ki (a hőmérséklettől függően), a halivadék 3-4 nappal később úszik el. Legelőször etessünk infuzóriával, míg el nem érik azt a méretet, hogy a mikrót és a sórakocskát is el tudják fogyasztani.

Akár társas akváriumban is gondozható, miután beszoktak, mozgékony és aktív hallá válnak. A száraz eleséget is szívesen fogyasztja. Kontrasztos kinézetével feldobja az akváriumokat. Ha hínárral árnyékolunk, halunk nagyon jól fogja magát érezni és remek, csodás színeket ölt! Akár az akvarisztikában még nem túl elmélyült személyek is tarthatják, mivel gondozás nem bonyolult!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyocharax analis*, *Aphyocharax filigerus*, *Bleptonema amazonae*, *Prionobrama amazonae*, *Prionobrama madeirae*.

Eng: Glass Bloodfin Tetra, Glass bloodfin, Glass bloodfish.

Egyéb köznevei: Glastetra, Lasitetra, Rotflossen-Glassalmmler, Sardina, Glastetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cope](#), [Prionobrama filigera](#), [Törpe üveglazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1870](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [nagyon aktív mozgású](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 07:11:01

Katalógus ID: 4048

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/prionobrama-filigera.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva