

Protomelas taeniolatus - Pompás királlysügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Trewavas, 1935
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	16-18 cm
C°:	26-27
pH°:	7-8
Nk°:	15-25
HELYIGÉNY:	300-320 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	elsősorban ragadozó
TARTÓZKODIK?	leginkább középső
ÉLETTARTAM:	kb.10 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Protomelas taeniolatus

Pompás királlysügér
(Trewavas, 1935)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Alapvetően egy magas hátú fajról van szó, ahol a hím kékeslila hátú és bordó hasoldalú, míg háti úszója egészen lilás sárga szegéllyel. A nősténye ezüstös alapszínű, egy fekete hosszanti csíkkal. Van még több színváltozata is, például a *P. taeniolatus* "Boadzulu Red", melynél a hím pompás vörösben tündököl, vagy épp a *P. taeniolatus* "Likoma Zebra". Ezen variációnál a nőstény szépen becsíkozódott, míg a hímeken inkább a kék és a sárga dominál. Magyarul likomai zebrasügér néven kerül forgalomba a variáns. A harmadik ismertebb színváltozata pedig a *P. taeniolatus* "Nkanda", itt a nőstény sokkal sötétebb mintázatú, már-már elvesznek, egybemosódnak függőleges csíkjai, ellenben a krémsárga és halványkék alapszínekkel rendelkező hímen sötétkékekkel jól kirajzolódnak a csíkok.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Alapvetően nem tartozik a nehezen kezelhető sügerek közé, malawi társas medencében mbuna sügerekkel jól társítható. A hímek közepesen agresszívek egymással, kis medencében (sügerekhez mérten kis medencéről van szó!) inkább egy hímes háremben tartsuk őket. A Nkanda változatnál érdekesség, hogy több hím is sokkal jobban kijön egymással, mint mondjuk az alapváltozatnál, de az nem elfelejtendő, hogy az alapvariáns is tartható több hímben is, csak kellő helyük legyen. Rendszeresen cserélt, jól szűretett vízben jól érzik magukat. Kövekből építhetünk búvóhelyeket, Anubiasokkal dekorálhatunk.

Etetése szempontjából elfogadja a száraz tápokot is, de néha egy kis fagyasztott sügérmixszel jó lenne kiegészíteni. Jó minőségű tápokot igényel, pláne a likomai változat hajlamosabb bélgyulladásra, de ne az *Apistogrammák* szintjén gondolkozzunk ettől függetlenül, mindössze a minőségre fektessünk hangsúlyt.

Talajra ívik általában, anyai szájköltő, kb. 3 hét forgatás után 20-30 kishal a várható mennyiség. Frissen keltetett Artemiával etetve naponta többször, és ügyelve a friss vízre és a vízminőségre, megindul növekedésük és szép kis csapatot nevelhetünk föl.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: .

Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Afrikai sügerek](#), [Trewavas, 1935](#), [Pompás királysügér](#), [Protomelas taeniolatus](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Malawi-tó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [ragadozó](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [gyér növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-11-18 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2016-12-21 09:51:42

Katalógus ID: 4496

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/protomelas-taeniolatus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva