

Pseudotropheus crabro - Kaméleonsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ribbink, 1982
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	16-18 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	400-450 liter
VISELKEDÉS:	nem a legjobb társasági faj
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	~8-9 év
TERM.VÉD.:	



Pseudotropheus crabro
Kaméleonsügér
(Ribbink, 1982)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pseudotropheus crabro – Kaméleonsügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Rendkívül változékony faj, több színváltozata is van, és könnyedén változtatja alapszínét bizonyos határokon belül. A fiatal egyedek általában élénk színűek, például citromsárgák, nagyon dekoratív a keresztsávós változat. A kifejlett egyedek sárgás-barnás alapszínűek, de a hímek például kékes színre is tudnak változni. Két legelterjedtebb változata a világosabb alapon sötét keresztsávós variáns, vagy a sötétebb alapszínű, de a háton fehér foltokat viselő változat. Keressünk minél szebb mintázatú példányokat (szabályos foltok vagy szépen egymás mellett haladó sávok), mert annál jobb tenyésztörzsből való. A Mbuna élettani csoportba tartozik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szívesen bujkál kövek között, ezt akvárium tartásánál is vegyük figyelembe. Építsünk neki barlangokat, ahová később szívesen behúzódik, ha pihenni vágyik a sok úszás után. Aktívan mozgó faj alapvetően. A köves tájat kidekorálhatjuk pár tő Anubiassal is, de talajnak sódert tegyünk. Ügyeljünk arra, hogy a vízilándsák gyöktörzse ne kerüljön betemetésre, mert a növények kirohadnak. Nem igényel átlagosnál erősebb szűrést és oxigenizációt.

Viselkedése gyakran nagyon is egyedfüggő, vannak egészen békés példányok, míg mások agresszívabbak is lehetnek, de alapvetően egy uralkodó-típusú sügér. Ne lepődjünk meg, ha "kisfőnökként" először ők fognak táplálékhoz folyamodni. Nagy akváriumban hasonló habitusú sügerekkel, valamint harcsákkal helyezhetjük egybe. A természetben szívesen él együtt szimbiózisban nagytestű harcsákkal (pl. *Bagrus meridionalis*). A sügerek lecsipegetik a harcsák testéről az élősködőket, ezzel mintegy jól is laknak, valamint a harcsának is segítenek. De a szemfüles kis állatok kiveszik a jussukat, amikor a sügerek ívására kerül sor, és bizony csipegetnek a bőséges harcsaikralakomából.

Etetésük teljesen problémamentes, általános sügérgranulátumok megfelelnek nekik, de figyeljünk, hogy növényi eredetű granulátumot is kapjanak, és akár szúnyoglárvával ki is egészíthetjük eleségüket. Mérsékeljük a táplálékadagot, mert könnyedén hízásnak indulhatnak, és akkor nemhogy csak egészségük romlik, attraktivitásukból is jelentősen veszítenek.

Tenyésztése is aránylag egyszerűen megoldható. Anyai szájköltők, de náluk nem árt odafigyelni, hogy kb. két hét után elvegyük az ikrákat (meghánytassuk az anyát), mert gyakran lenyelheti, túlhordhatja őket túlféltésből. A kishalak rendszeres vízcserek és bőséges hely mellett hamar megnőnek, sórákkal indíthatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Maylandia crabro*, *Melanochromis crabro*.

Eng: Bumblebee Cichlid, Hornet Cichlid, Bumblebee Mbuna.

Egyéb köznevei: Chameleon mouthbrooders, Chameleobuntbarsch, Ampiaismalawinahven, Mbuna, Tlamovec crabro cameleo, Arendsz-Cichlids, Pyszczak szerszeń, Хамелеон.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Kaméleonsügér](#), [Pseudotropheus crabro](#), [Ribbink](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1982](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#)

JELLEMZŐK:**FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:**

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-23 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:21:38

Katalógus ID: 4460

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/pseudotropheus-crabro.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva