

Pseudoxiphophorus bimaculatus - Kétpettyes fogasponty

ELSŐ LEÍRÓJA:	Heckel, 1848
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	7 cm
C°:	20-27
pH°:	6-8
Nk°:	10-18
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	elég agresszív
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Pseudoxiphophorus bimaculatus

Kétpettyes fogasponty
(Heckel, 1848)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pseudoxiphophorus bimaculatus – Kétpettyes fogasponty elterjedési területe
(Map)

Folyók, patakok, tavak Mexikóban és Belízben,
 valamint Hundurasban és Guatamalában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Változatos színezetű faj: az itt látható, hegyi patakokból származó példányok színe kékes-fényű zöldes aranybarna; a síkvidéki állóvizek halai inkább foltosak. A pikkelyek szegélye sötét. A faroknyél két oldalán általában egy-egy nagyobb folt található. A hátúszót foltok tarkítják.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Agresszív és szapora faj. Társítani csak erős, robosztus, támadásait visszaverő fajokkal lehet. Egyfajos medencében érdemes tartani, ilyenkor úgy 60 liter is elég lehet. Általában elevenszülőkkel foglalkozó specialisták érdeklődnek a faj iránt, nekik mindenképp megéri egyfajosan tartani, mások viszont valóban nagyobb termetű halakkal társítsák, mint például erősebb pontyfélék, közepesen agresszív vagy közepesen nagyobbacska sügérek. Legyen dús növényzet, erősebb szűrő. Nem kedveli a károsanyagokkal telített vizet, rendszeres részleges vízcseréssel gondoskodjunk annak frissességéről. Az oxigénellátást se hanyagoljuk el. Kárt tehet a nagyon lágy növényekben is, de mindenevőként nem valószínű, hogy a kicsit keményebb levelű növényzetet lelegetné. Úszónövényzettel árnyékolhatunk, a sötét talaj kiemeli színeit és biztonságérzetet nyújt. Vegyes táplálékot igényelnek, száraz táp eledelüket egészítsük ki spirulinás pehelytáppal és/vagy forrázott zöldségekkel, de kínáljuk meg szúnyoglárvával, artémiával, cyclopsszal, tubifexel vagy grindálféreggel egyaránt. Csak ritkán kapható. A kishalakat megtámadja, ivadékait is védeni kell éhes anyjuk elől! Mindenképp szülőketrecet alkalmazunk, az ivadékok medencéjét is béleljük ki hínárral, hogy idővel ne lépjen fel a hímek között kis helyen agresszió.

Nem igényes hal, mind tartása, mind tenyésztése nem nehéz feladat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Poeciloides bimaculatus*, *Heterandria bimaculata*, *Pseudoxiphophorus bimaculatus peninsulae*, *Pseudoxiphophorus bimaculatus taeniatus*, *Pseudoxiphophorus pauciradiatus*, *Pseudoxiphophorus peninsulae*, *Pseudoxiphophorus reticulatus*, *Pseudoxiphophorus taeniatus*, *Xiphophorus bimaculatus*.

Eng: Twospot livebearer, Spottail killifish.

Egyéb köznevei: Toplettet tandkarpe, Uægte Sværddrager, Pälvihammaskarppi, Zweifleck-Kärpfling, Mieczyk dwukropek, Guatopote manchado.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Pseudoxiphophorus bimaculatus](#), [Kétpettyes fogasponty](#), [Heckel, 1848](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#), [Poeciliidae](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[felső szint](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [középső szint](#), [mindenevő](#), [közepesen aktív mozgású](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [átlagszó vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [trópusi](#), [Közép-Amerika](#), [Amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 11:51:46

Katalógus ID: 3901

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/pseudoxiphophorus-bimaculatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva