

Puntigrus tetrazona - Szumátrai díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Vaillant, 1902
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	20-26
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-19
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Puntigrus tetrazona
Szumátrai díszmárna
 (Vaillant, 1902)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Puntigrus tetrazona – Szumátrai díszmárna elterjedési területe (Map)



Borneó (*Kapuas, Mahakam, Bulungan*) folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Világosbarna testét négy, sötét, függőleges sáv keresztezi; fekete hátúszójának szegélye vörös. Mell- és hasúszói szintén vörösek, míg a farkúszó vörös lebenyei közti tér színtelen. A hím orra élénk vörös, a nőstények színezete fakóbb. Fontos, hogy ugyan néha csak kevésbé, de a farkúszó vörös színezete valamennyire mindig látszik, ez különbözteti meg leginkább a rokon fajoktól.

Bebizonyították, hogy az ismertebb mesterséges változatok (vörös szumi, zöld szumi) biztosan a *Puntigrus tetrazona* fajtól származnak. Egyébként több, már-már megszólalásig hasonló fajt is ismerünk. Ilyenek

például a *Puntius anchisporus*, *P.navjostodhii*, *P. partipentazona*, *P.pulcher*.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az szumátrai díszmárnák leginkább maguk között, rajban tarthatók. Nyugodtabb halak társaságában túlságosan élénkek és veszekedősek. Szeretnek más halak úszónyúlványaiba harapni, csipkedni, ezért ne tartsuk együtt vitorlášalakkal vagy gurámikkal. Ha rajban tartjuk, mérséklődik ez a viselkedésforma. Csíkokkal, sziámi algázókkal, márnákkal, dániókkal és razbórákkal kitűnően társíthatóak, de bizonyos pontylazacokkal, páncélosarcsákkal is jól megvan, de ilyenkor nem beszélhetünk biotóp társításról! Általában ez az öves díszmárna is érzékeny a víz minőségének romlására, ezért vize ne legyen se túlságosan friss, se nagyon öreg. Nitrifikációs mérgezés esetén fejenáll!

A díszmárnák többsége társas akváriumban való tartásra kitűnően alkalmas. Csupán arra kell vigyázni, hogy ne kerüljenek nyugodt halakkal egy tartályba, amelyeknek a kissé nyugtalan viselkedésű márnák könnyen a terhükre lehetnének.

A táplálás nem okoz nehézséget, mert fő eseségül jó szárított táplálékot adva, egészségben tarthatók. Elegendő, ha néha-néha kiegészítésül kapnak kevés élőleleséget, különösen akkor, ha tenyésztetni akarjuk őket. Végül figyelemmel kell lenni arra, hogy sok márna szívesen úszkál le-lebukdácsolva. Miközben a talajban túrnak táplálék után, könnyen okozhatnak olyan elpiszkolódást, amely főleg a finompelyhű növényekre veszélyes lehet.

A díszmárnák tenyésztése aligha okozhat említésre méltó nehézségeket, noha egyik-másik faj némileg gondosabb kezelést igényel, mint a többség.

Ennek a fajnak a tenyésztése sem mindig egyszerű. Lány vízre van szüksége, mert az ikrák kemény vízben rosszul fejlődnek.

A faj úgynevezett szabadon ívó. A tenyésztésre a korai tavasz a legalkalmasabb. A párok a szabad természetben a rajból különülnek el, az akváriumban egy ivarérett nőstényre általában két hímet számítunk, de az 1:1 arányú párosítás is javasolható. A hímek élénk ütemű, de többnyire ártalmatlan, imponáló jellegű viadalokat vívnak egymással. Gyakori az is, hogy az akváriumban meghatározott helyet tartanak fenn maguknak, amelyet rövid pihenőkre fölkeresnek. A násztánc nagyon érdekes. A hímek a nőstényeket táncos mozdulatokkal udvarolják körül, mereven kifeszítik úszóikat, és sajátságos módon remegnek. Néha szinte fejre állnak, vagy úszóikkal verdesnek, miközben a pár rövid ideig egy helyen marad. Gyakori az is, hogy a hímek a nőstényt ivarnyílásának környékén az orrukkal bökdösik. A nászjátékot időnként alapos kergetődés szakítja félbe, amikor is néha jókora sebességet érnek el. Az ívás többnyire a reggeli órákban folyik le. Néhány látszátpárzás előzi meg. A hím kergetődés közben hirtelen a nőstény oldalához úszik. A pár egy kis ideig egymáshoz simul. Általában a növények között játszódik le mindez, de néha a nyílt vízben is végbemehet. Ezután heves lökésekkel következik be a peték lerakása és megtermékenyítése, miközben a halak nemritkán vagy eltaszítódnak egymástól, vagy egymás körül köröznek. A petéket a víz heves mozgása messzire elsodorja, s ha ragadós hurkuk van, rátapadnak a növényekre, egyébként lehullanak a fenékre. Az ikrák többnyire kb. kölesszem nagyságúak. Párzásonként 20—230 petét raknak, a fajtól, nagyságtól és életkortól függően összesen néhány százat. Az ívás folyamata a maga egészében több óra hosszát is eltarthat. Ha befejeződött, a szülőket rögtön ki kell venni

az akváriumból, mert nagyon ikrafalók. Ívás közben néhány Enchytraeust is adhatunk eleségként. Az ikra védelméhez különleges rendszabályokra van szükség. A fenékre nagy kavicsokat kell rakni, s finompelyhű, üvegcsövecskékkel nehezített növényréteget kell rájuk teríteni. Ikrarostély használata is javasolható.

Az ivadékok kb. 30 óra múlva bújnak ki, s 24-26 óra hosszat üvegesen átlátszó, 4-5 mm hosszú vonalacskák alakjában függenek az üveglapokon, növényeken vagy egyéb tárgyakon. Néhány nap múlva szabadon úszkálva már eleség után keresgélnek. Először infuzóriával, főtt tojássárgájával és nagyon finom porelességgel, néhány nappal később — a növekedés üteme szerint — nagyobb szemű porelességgel és szárított táplálékkal etethetünk. Jó etetés hatására kb. két hét múlva szűrt Cyclopsokat, három héttel később pedig már normális nagyságú táplálékot fogyasztanak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Szumi.

syn: *Barbus tetrazona*, *Puntius tetrazona*, *Capoeta tetrazona*, *Systemus tetrazona*, *Systemus sumatrensis* .

Eng: Green tiger barb, Partbelt barb, Sumatra barb, Sumatra barb, Tiger barb, Tirger.

Egyéb köznevei: Parmička bulunganská, Berbaju , Sumatránka, Sumatránská parmička, Sumatrabarbe, Tigerbarbe, Tiikeribarbi, Moosbarbe, Sumatrabarbe, Viergürtelbarbe, Ikan baja, Chetyrekhpolosyi, Tigerbarb.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Vaillant](#), [Szumátrai díszmárna](#), [Puntigrus tetrazona](#), [1902](#), [Pontyfélék](#), [Cyprinidae](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [békés viselkedés](#), [alsó szint](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Borneó](#), [Dél-Ázsia](#), [Ázsia](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [átlagos növényzetigényű](#), [felső szint](#), [középső szint](#), [mindenevő](#), [közepesen aktív mozgású](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-09-10 07:45:24

Katalógus ID: 3927

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/puntigrus-tetrazona.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva