

Puntius chola - Kopoltyúfoltos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	10 cm
C°:	20-25
pH°:	6-6,5
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	180 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Puntius chola
Kopoltyúfoltos díszmárna
(Hamilton, 1822)

TOVÁBBI KÉPEK:



Puntius chola – Kopoltyúfoltos díszmárna elterjedési területe (Map)

Északkelet-bengáliai hálnak tartják, a Ganges folyórendszerében honos. Ezen kívül széles körben elterjedt: Pakisztán, India, Srí Lanka, Nepál, Bhután, Bangladesh, Myanmar és Nyugat-Thaiföld mind-mind lelőhelye közé tartozik.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az oldalt lapított test meglehetősen zömöknek hat. Feje és szája kicsiny, szájrése felfelé irányul, és 1 pár bajuszt hord. D 11, A 7. Hosszúsága hazájában 13-15 cm, míg az akváriumban 10 cm-ig nő meg. Ragyogóan ezüstös, zöldesszürke csillogású. A kopoltyúfedőkön egy-egy nagy, aranyosvörös színű folt van. Az úszók sárgásak vagy vörösesek; a hátúszó töve fekete. A hím íváskor vöröses színű, ezenkívül

általában karcsúbb is a nősténynél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szobahőmérsékleten tartható. A medencét jól le kell takarni, mert szeret ugrálni.

Rajhal, ezt ne tévesszük szem elől, mindig minimum 6 halat tartsunk! Kezdők kíváló hala lehet, aktív úszó, attraktívan mozgolódó faj, hasonlóan más pontyfélékhez, melyekkel viszont kiválóan társítható. Társas medencébe hasonló kaliberű halakkal kerüljön egybe. A zsenge növényeket sajnos megcsipkedheti, ezért erősebb levelű növényt ültessünk, de inkább szegélynövényzetnek, hogy elegendő úszótér maradjon. Érdekes külső szűrést alkalmazni.

Etethető lemezes és granulált tápokkal, de hálás az élő és fagyasztott kiegészítésért, forrázott zöldségekért egyaránt!

Tenyésztése során jól kondicionált, élő eledelokkal szépen felerősített halakat válasszunk, melyek legyenek nagyon szépek, a nőstények erősen ikrásak. Íváskor a hímek napokon keresztül szép vöröses csíkokat viselnek, sőt, pár órára a nőstények is! Ikrarácsot használjunk, mert saját ikráikat felfalhatják, amúgy szabadon szórják őket. Jávai mohát szintúgy rakhatunk a medencébe. Az elúszott ivadékok infusoria-méretű eledellel indíthatóak, majd artémia nauplián, banánférgen jól nevelhetőek. Tágas helyre lesz szükség, mivel sok ivadék lehet!

Sajnos ez a faj nem túl elterjedt a hazai akvarisztikában, valószínűleg tompa színei miatt sem túl kedvelt!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Cyprinus chola*, *Puntius titius*, *Barbus titius*, *Barbus chola*, *Capoeta chola*, *Systemus tetrapagus*, *Barbus tetrapagus*, *Puntius tetrapagus*, *Systemus inimaculatus*, *Barbus unimaculatus*, *Leuciscus thermalis*, *Barbus sophoroides*

Eng.: *Swamp barb*, *Chola barb*, *Green barb*,

Egyéb nevei: Chala punti, Punti, nga-nyanma, Parmička nádherná, Euobarbi, Kiemenfleckbarbe, Dodda karsae, Shalynnai tungtab, Katchi paral, [?][?][?][?], Khavli, Pothi, Pothiya, Sidhre, Sidre, Kota ipilla, Kooran kendai

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Kopolyúfoltos díszmárna](#), [Puntius chola](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1822](#), [Akváriumi halak](#), [Hamilton](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [India](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Dél-Ázsia](#), [Nyugat-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Thaiföld](#), [Pakisztán](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sárga vízi](#), [Sri-Lanka](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagyon aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [középső szint](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 11:25:03

Katalógus ID: 3970

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/puntius-chola.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva