


Rasbora borapetensis - Sziámi razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Smith, 1934
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22-26
pH°:	6,5-7,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	gyakori


Rasbora borapetensis

Sziámi razbóra
(Smith, 1934)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rasbora borapetensis – Sziámi razbóra elterjedési területe (Map)

Elsősorban Thaiföld patakjai, de regisztráltak már több más helyről, így széles elterjedési területhez tartozik Laos, Kambodzsa, Vietnám, Malajzia, Indonézia, Borneó, Szingapur, Szunda-szigetek, Fülöp-szigetek, sőt, még Kína egy részén is elterjedtek!

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Karcsú, halványsárga testén a kopoltyúfedőtől a faroknyél végéig feltűnő sötét sáv fut végig, melyet kihangsúlyoz a föllette futó aranszínű vonal. A farok alatti úszó alapján is végighúzódik egy sötét vonal. A farokúszó az ivarérett példányokon vörössé válik. A hímek karcsúbbak a nőstényeknél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem nehéz tartani, viszont csapatot igényel! Legalább 6 állatot vásároljunk. Felszín közeli életmódot folytat, kedveli, ha van áramlás medencéjében, ahol csapatostul tudnak lubickolni. Kezdőknek is alkalmas, átlagos akvárium vízhőmérséklet mellett tartható, akár csapvízben is! Természetesen azért részleges vízcserékre szükség van és a medence oxigenizációjára sem árt ügyelni. Nem szükséges hatalmas medence, egy közepes 60-70 literes akváriumban is jól érzik már magukat.

Társítása sem problémás hasonló méretű halakkal, könnyen együttél dániókkal, kisebb díszmárnákkal, talajlakó pontyfélékkel vagy éppen törpegurámikkal. Vegyes társas medencebéli tartása sem nagy probléma, hiszen eleve szülőkkel, lazacokkal, vértesharcsákkal is egyberakható.

Némi úszóteret hagyjunk nekik, de emellett egy átlagos növényesítetttség sem árt, ahová néha behúzódhatnak pihenni.

Száraz eledelkkel etethető, elfogadja őket, de hálás egy kevés élő vagy fagyasztott eleségért, artémiát, cyclopsot rendszeresen kapjon, hogy vitalitását és színeit megőrizze.

Szapora halak, de felfalják ikráikat. Ikrarács használata épp ezért célszerű!

A tenyésztéshez alacsony vízszintű medencét használjunk, az aljára sok kavicsot és finoman tagolt növényeket tegyünk. Erre főleg a Nitella, a forrásmoha, vagy zöld műanyagfonalak alkalmasak. Az így elkészített aljzat a lesüllyedő ikrákat megvédi a szülők falánkságától, akár csak az előzőekben javasolt ívatórács.

Az ívási aktus lefolyása általában hasonlít a dániókéhoz. Akárcsak a dánióknál, itt is tehetünk egy nőtény mellé több hímeket. Az ívás gyakran a hajnali napsütésben zajlik le. Az ivadékok felnevelése általában nem nehéz, azonos a többi pontyféléével, lényegében mikroszkópikus méretű élő eleséggel indítunk, majd artémián, rotatórián jól nevelhetők.

A hideg vízcserék javítják az ívási kedvet, az ivadékok hőmérséklettől függően 18 és 48 óra között kikelnek, majd 1-2 nap múlva már el is úsznak.

A *Rasbora rubrodorsalis* megtévesztően hasonlít rá, gyakran árusítják egy név alatt mindkét fajt! Jellemző, hogy a *R. rubrodorsalis* kevésbé kontúros csíkokkal rendelkezik, gyakran elmosódott a testének a színe (kedélyállapottól függhet, van, hogy egyáltalán nem látszik csík rajta), viszont hátúszója is piros!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: Blackline rasbora, , Borapet rasbora, Red tail rasbora, Red-tailed rasbora, Redtail rasbora.

Egyéb köznevei: Parmička černoocasá, Razbora černopruhá, Rødhalet rasbora, Punapyrstörasbora, Rotflossenrasbora, Rotschwanzrasbora, Trey changwa srawlung, Pa sieu, Razbora czerwonopletwa,

Rödstjärtsrasbora, Pla siew hang daeng, Pla siew hang dang.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Smith](#), [Sziámi razbóra](#), [Rasbora borapetensis](#), [1934](#), [Pontyfélék](#), [Cyprinidae](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [békés rajhal](#), [gyors vízáramlású](#), [nagyon aktív mozgású](#), [sárga vízi](#), [barna vízi](#), [átlagos növényzetigényű](#), [felső szint](#), [középső szint](#), [mindenevő](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [átlátszó vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-19 09:29:04

Katalógus ID: 3933

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-borapetensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva