

Rasbora caudimaculata - Kűszrazbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Volz, 1903
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	15 cm
C°:	20-26
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	3-15
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-7 év
TERM.VÉD.:	felméretlen


Rasbora caudimaculata
Kűszrazbóra

(Volz, 1903)

TOVÁBBI KÉPEK:
TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Rasbora caudimaculata – Kűszrazbóra elterjedési területe (Map)


Thaiföld, Malajzia és Indonézia kis folyói, patakjai.

Többek között Borneó, Szumátra és a Szunda-szigetek lakója is!

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

 Feltűnő jellegzetessége farkúszója, ami mélyen villás és sárga színű lebenyei fehér csúcsú fekete foltban végződnek. A nőstények testének körmérete a szaporodási időszakban megnő. Alakja hasonlít a *R. trilineata*-éhoz igen nyúlánk, oldalt lapított. Hosszúsága: 15 cm-ig.

Ezüstösen csillogó alapon elmosódó, aranyos vagy zöld színben fénylő, hosszanti csík látszik. Minden egyes pikkelynek sötét szegélye van, ez finom hálós rajzolatot eredményez. A farkúszó lebenyein fekete,

narancsszínnel szegélyezett csíkok vannak.

Az ivari különbségek nem feltűnőek. A hím fark alatti úszója egy kissé sárgás tónusú, s farkúszójának a két hegye fehérebb, mint a nőstényé. A nőstény ívási időben jóval teltebb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Viszonylag mozgékony faj, tágas akváriumot igényel, de túlságosan nem zavarja a lassabb mozgású halakat sem, mint amilyenek a gurámik.

Szívesen úszkáló, elegáns és békés rajhal, amely elég nagy medencét igényel. Az akváriumot jól le kell takarni, mert ugrálni is szeret ! A kívánt hőmérséklet: 20— 26 C°. A víz összetételére nem kényes, bár a vízcserékre ügyelni kell, továbbá a szűrés is legyen olyan szempontból megfelelő, hogy a feldúsuló károsanyag-tartalmat képes legyen megkötni és tiszta, lebegő koszoszemcséktől mentes vizet biztosítani.

Szereti, ha van elég úszótere, de ettől függetlenül növényesíthetünk. Kövekkel és ágakkal dekorálhatunk. Minimum 6 példányt vásároljunk!

Könnyen társítható, békésen viselkedő razbórafaj, társas akváriumokba is megfelelő! Biotóp medence esetén akár nagyobb termetű márnákkal is társíthatjuk, hisz a természetben is találkozhat például a farkszalagos vagy tiofil díszmárnával, akár csak a *Puntius johorensis*-szel. Természetesen más márnák, dániók, razbórák is kerülhetnek mellé. Talajlakónak különböző *Crossocheilusokat*, *Pangiokat*, *Nemacheilusokat* és *Botiákat* tudok ajánlani.

Bármilyen élő- vagy szárazeleseget elfogad. Egészségi állapota és szépsége viszont rendszeres időközönkénti fagyasztott vagy élő eleséggel történő etetés mellett lesz az igazi.

A tenyésztéshez alacsony vízszintű medencét használjunk, az aljára sok kavicsot és finoman tagolt növényeket tegyünk. Erre főleg a Nitella, a forrásmoha, vagy zöld műanyagfonalak alkalmasak. Az így elkészített aljzat a lesüllyedő ikrákat megvédi a szülők falánkságától. Ez ikraráccsal is pótolható.

Az ívási aktus lefolyása általában hasonlít a dániókéhoz. Akárcsak a dánióknál, itt is tehetünk egy nőstény mellé több hímeket. Az ívás gyakran a hajnali napsütésben zajlik le. Az ivadékok felnevelése általában nem nehéz, frissen kelt artémiával indíthatóak.

A szülőket élő eleséggel készítsük fel az ívasra. A medencébe 25 C közeli, lágy és semleges vizet töltsünk, a hűvös vízcserék viszont serkentik az ívási kedvet. Az ikra lerakásától kezdve hőmérséklettől függően 3-4 nap után már etethetjük az ivadékokat!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Rasbora dorsimaculata*.

Eng: Greater scissortail, Giant scissortail.

Egyéb köznevei: Rasbora velká, Razbora pestroocasá, Stor saksehale, Red scissortail, Redtail rasbora, Kultasaksipyrstö, Schwanzbindenrasbora, Schwanzfleckbärbling, Enseluai, Trey changwa poht, Seluang engkrunyuk.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Rasbora caudimaculata](#), [Volz](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [1903](#), [Kűszrazbóra](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen áramló vízi](#), [Szumátra](#), [mindenevő](#), [Thaiföld](#), [középső szint](#), [nagyon aktív mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [felső szint](#), [gyors vízáramlású](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Borneó](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [igenlágvyízi \(0-5°Nk\)](#), [barna vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [lágvyízi \(5-10 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Indonézia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-19 09:33:13

Katalógus ID: 3934

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-caudimaculata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva