Rasbora daniconius - Karcsú razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	8-12 cm
C°:	24-26
pH°:	6-7
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Rasbora daniconius
Karcsú razbóra
(Hamilton, 1822)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rasbora daniconius – Karcsú razbóra elterjedési területe (Map)

Burma, Nagy Szunda-szigetek és Thaiföld patakjai, folyói; India délkeleti részén és Srí-Lankán is előfordul. Álló- és áramló vizekben egyaránt él, mindenütt nagyon gyakori.

TOVÁBBI KÉPEK:









KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Megnyúlt, karcsú testének hát- és hasvonala kissé görbült, kissé hasonlít a kurta bainghoz.. Ezüstszínű teste bíbor, zöld vagy sárga ragyogású. Oldalán kékesfekete vonal húzódik végig. A hím úszói sárga árnyalatúak; a nőstény teste valamivel teltebb.

Hazájában kb. 20 cm, akváriumban csak 12 cm körüli méretűre nő.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon hasonlít a Rasbora einthovenii-re.

Minthogy szinte csupa eleven rajhalról van szó; kellően nagy medencéről és kiúszótérről kell gondoskodni számukra. A razbórák vagy azonos fajúak rajában, vagy hasonló életmódú halak társaságában érvényesülnek a legjobban. Ehhez a fajból legalább 5-6 db-ot kellene tartani. A növényzet ne menjen a kiúszótér rovására.

A szűrésről gondoskodjunk megfelelően, akárcsak a részleges vízcserékről, hogy halaink lehetőleg friss és bomlástermékmentes vízben lehessenek. Ágakkal, kövekkel dekorálhatunk.

Társítani lehet könnyedén más halakkal, így társas medencébe is megfelelő, de biotopikusan más dániókkal, márnákkal és ázsiai talajlakókkal is könnyedén társíthatjuk.

Táplálásuk nem nehéz; bármilyen élő- vagy száraz-eleséget elfogadnak. Szívesen tartózkodnak a felszín közelében. Elsősorban rárepülő rovarokkal táplálkoznak, amelyek egy részét a vízből kiugorva kapják el. Az akváriumot már csak ezért is jól le kell takarni. Célszerű apró rovarokkal (szárnyatlan muslinca), szúnyoglárvával, grindálféreggel, artémiával is időnként megetetni.

A hőmérséklet 22-24 °C, tenyésztéskor 24-26 °C legyen. A tenyésztéshez alacsony vízszintű medencét használjunk, az aljára sok kavicsot és finoman tagolt növényeket tegyünk. Erre főleg a Nitella, a forrásmoha, vagy zöld műanyagfonalak alkalmasak. Az így elkészített aljzat a lesüllyedő ikrákat megvédi a szülők falánkságától, akárcsak az ívatórács.

Az ívási aktus lefolyása általában hasonlít a dánióékhoz. Akárcsak a dánióknál, itt is tehetünk egy nőstény mellé több hímet. Az ívás gyakran a hajnali napsütésben zajlik le. Az ivadékok felnevelése általában nem nehéz, apró élő eledellel próbálkozzunk. Az ívatóvíz lágy és semleges legyen lehetőleg. A kis razbórák jó tempóban nevelhetőek!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cyprinus daniconius, Leuciscus daniconius, Opsarius daniconius*.

Eng: Blackline rasbora, Common rasbora, Slender barb, Slender rasbora, Striped rasbora.

Egyéb köznevei: Dohni kona, Angjani, Danikono, Darkina, Dhera, Nga-zin-byun, Rasbora štíhlá, Razbora podélnopruhá, Guldstreget Rasbora, Sortstreget rasbora, Sinijuovarasbora, Schlankbärbling, Darai, Jonir, Golai, Kolaonjan kenda, Kolkane, Neddean jabbu, Ogari, Pattai Kunju, Vaina paruva, Trey changwa chhnoht, Kokanutchee, Thuppal kudiku, Dandai, Dandwan, Dondai gana, Daniconius, Dedua, Dehra, Jilo, Razbora smukla, Charl, Chinodolah, Raankaalle, Mile laoh, расбора индийская, Indiyskaya rasbora, Dandiya, Ovaree kendai, Ovareecande, Patta kanju, Purroovoo, Jobidayee.

KATEGÓRIÁK:

Pontyfélék, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

Karcsú razbóra, Rasbora daniconius, Cyprinidae, Akváriumi halak, Pontyfélék, akvarisztika, 1822, Hamilton

JELLEMZŐK:

barna vízi, Vietnám, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Ázsia, India, közepesen áramló vízi, Dél-Ázsia, Sri-Lanka, közepesen aktív mozgású, Szumátra, mindenevő, Thaiföld, középső szint, sárga vízi, félsavas (6-6.5 pH), felső szint, gyors vízáramlású, hőigényes (25-30 °C), átlagos élethossza 3-6 év, normál (6.5-7.5 pH), átlagos növényzetigényű, igenlágyvízi (0-5°Nk), normálméretű akvárium 100-200 literig, közepes méretű 5-10 cm, lágyvízi (5-10 Nk°), nagyméretű 10-20 cm, közepes hőigényű 20-25°C.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15
Legutolsó frissítés: 2014-06-19 09:37:57
Katalógus ID: 3935
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-daniconius.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva