

Rasbora elegans - Ékszer razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Volz, 1903
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	8-15 cm
C°:	22-25
pH°:	6-7
Nk°:	3-12
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	gyakori


Rasbora elegans
Ékszer razbóra

(Volz, 1903)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rasbora elegans – Ékszer razbóra elterjedési területe (Map)



Szingapúr, Nagy Szunda-szigetek, Borneó, Malajzia és Szumátra folyó- és állóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hátoldalának világos, zöldesbarna színe a testoldalon ezüstös árnyalatúvá válik: oldalfényben ibolyás fényű. Testén két, kékesfekete folt van; egy feltűnően szögletes a hátúszó alatt, a másik faroknyél végén. A farok alatti úszó alapja is fekete; szeme nagy.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Közepes méretű, mozgékony faj. Rajban tartasuk mindenképpen, ami legalább 6 állatot feltételez.

Akváriumban ritkán nő meg 8 cm-nél nagyobbra, míg a természetben a 15 cm-t is elérheti. Tágas medencét igényel, melyben van a csapat számára elégséges kiúszótér. A növények közt megfelelő búvóhelyeket találhat, de a növényesítés nem mehet a kiúszótér rovására. Ágakkal remekül dekorálhatunk.

A vízcserékre ügyeljünk, ne legyen a víz telített különféle bomlástermékekkel, a nitrátos vizet nem kedvelik... A szűrés átlagos tendencián megfelel nekik, mint más halaknál szokás alkalmazni, extra áramlást sem igényelnek.

Vegyes társas medencébe is rakható halak, békések, jól kijönnek más kontinensek fajáival is, mint különböző elevenszülők, pontylazacok. Biotópon belül díszmárnákkal, dániókkal, díszcsíkokkal, algázókkal társíthatjuk.

Etetése is problémamentes, hiszen örömmel elfogadja a műeleséget is, bár szó ami szó, sokkal jobb számára a jó minőségű fagyasztott és élő eledel, örömmel vadászik artémiára, cyclopsra, fekete szúnyoglárvára.

Tenyésztése a rokon fajokhoz hasonlóan történik, lágy és semleges közeli vizet töltünk a tenyészmedencébe, melyben a vízoszlop ne legyen túl magas. Ikravédő hálót is célszerű behelyezni, mert máskülönben az ikrafaló szülők veszélyesek lesznek saját petéikre. Az élő eleségektől erős halakon látszanak a nemek, leginkább abban, hogy a nőstények beikrásodva sokkal teltebbek hím társaiknál. Este célszerű kihelyezni őket, hogy a másnap kora reggeli napkeltekor már ikrázhassanak is. Az ívási kedv fokozható hidegvizes vízcserékkal. 1-2 nap a kelési idő, majd további ugyanennyi az elúszásig, mely idő alatt a kishalak szikzacskójukból táplálkoznak. Ezután akár már az artémia naupliákat is elfogadják, de apró férgekkel (banánféreg, walterféreg) is jól lehet őket nevelni.

Több alfaja is akad, például a *Rasbora elegans bunguranensis*, *R. e. spilotaenia*.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Twospot rasbora, Elegant rasbora.

Egyéb köznevei: Razbora skvělá, Topleveltet Rasbora, Sanakirjassa englanti, Rozbora piękna, Razbora dvouskvrnná, Razbora nádherná, Pragtrasbora, Loistorasbora, Schmuckbärbling, Gul Rasbora.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [Pontyfélék](#), [akvarisztika](#), [1903](#), [Volz](#), [Ékszer razbóra](#), [Rasbora elegans](#)

JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [Szumátra](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [középső szint](#), [békés rajhal](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Borneó](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Indonézia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-19 09:49:15

Katalógus ID: 3938

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-elegans.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva