

Rasbora kottelati - Kottelat razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Lim, 1995
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	7 cm
C°:	23-28
pH°:	5,5-7
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	95 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Rasbora kottelati
Kottelat razbóra
(Lim, 1995)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rasbora kottelati – Kottelat razbóra elterjedési területe (Map)

Borneó endemikus hala.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Alakja igen áramvonalas, gyorsfolyású vizekhez alkalmazkodott. Teste alapszíne sárgásbarna, az oldalon egy sötét sáv húzódik. Úszói narancsosán áttetszők, farok úszója erősen hátranyilazott.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Élőhelye a kisebb magasságú hegyek folyóiban van, ahol is a víz középső területeit részesíti előnyben. Lelőhelyén elsősorban férgekkel táplálkozik, az érett felnőtt példányok az esős évszakban szaporodnak.

Rajhal, legalább 6 állatot tartsunk. Szükséges kellő kiűszótér számára, továbbá jól szűrt és oxigénben viszonylag gazdag víz! Amúgy viszont nem nevezhető igényes halnak, ezért akár már kezdőként is foglalkozhatunk velük. A részleges vízcserét persze ne hanyagoljuk, hiszen az elnitrátosodott vizet nem kedveli.

Bátran ültethetünk növényeket, melyek közt búvóhelyeket találhat, de ez ne menjen a szabad kiűszótér rovására! A sötét talaj kiemeli színeit, vizét kezelhetjük égartobozzal is!

Békés halak, jól együtt tarthatóak más fajokkal egy vegyes társas akváriumban, de egy dél-ázsiai biotópban is megállják a helyüket dániók, párduccsók és ajakos gurámik társaságában például.

A száraz tápokat, műlesek is elfogadja, de különféle férgekkel (tubifex, grindál), artémiával illik kiegészíteni étrendjét.

Szaporítása a rokon fajkéhez hasonlatosan történik, lágy és semleges közeli vízben a jól kondicionált párt lehetőleg este tesszük ki. Az ívásra már másnap hajnalban, a korai kelő Nap első sugarainál sor kerülhet. Az ikrák védelme érdekében mindenképpen célszerű az ikravédő háló alkalmazása. A szülőket természetesen ikrázás után el kell távolítani a tenyészedencéből, melynek vizét egy levegővel hajtott szivacs szűrővel tarthatjuk tisztán. Egy nőstényre akár több hím is számolható, csapatos ívatásnál értelem szerűen több ikrát nyerhetünk. A kishalak kikelése és elűszása összesen kb. 3-4 napig tart, hőmérsékletfüggően. Papucsállatkával indíthatunk, de amint elfogadják, váltsunk artémiára, mivel azzal sokkal eredményesebb lehet nevelésük.

Sajnos az akvarisztikában csak ritkán látott, kedves halfaj e razbóra!

Megtévesztésig hasonlít a mandarinrazbórára (Rasbora kalochroma), egyedül a farktövön látható kicsi és halvány sötét foltról lehet őket megkülönböztetni, mely a mandarinrazbórától hiányzik!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Kottelat rasbora.

Egyéb köznevei: . Razbora Kottelatova, 🐟🐟🐟

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [1995](#), [Cyprinidae](#), [Kottelat razbóra](#), [Akváriumi halak](#), [Lim](#), [akvarisztika](#), [Rasbora kottelati](#)

JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-Ázsia](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [békés rajhal](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Borneó](#), [igenlágvyízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lágvyízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 14:13:11

Katalógus ID: 3940

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-kottelati.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva