

Rasbora trilineata - Ollófarkú razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1870
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	10-13 cm
C°:	23-26
pH°:	6-8
Nk°:	2-12
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2013 július hala: az ollófarkú razbóra](#)

Rasbora trilineata

Ollófarkú razbóra

(Steindachner, 1870)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Borneó, Szumátra, Szunda-szigetek, Laos, Thaiföld, Kambodzsa és Malajzia patakjai, lassú vizű folyói és tavai. A Mekong-rendszerben is elterjedt faj!

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A háromcsíkú razbóra farokúszója erősen villás, a szép példányokén fekete és fehér foltok is vannak; a többi úszók színtelenek. A test alapszíne szürkészöld, a hasoldal ezüstös. Oldalain a hasvonal felett egy arany sáv látható, melyet még jobban kiemel a testközépen futó fekete csík. A nőstények jellemzően nagyobbra nőnek a hímeknél, míg ez utóbbiak színe íváskor erősebb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az ollófarkú razbóra igazi rajhal, csak csapatban érzi jól magát, ezért legalább 5-6 példányt tartsunk egyszerre. Társas akváriumba nyugodt természete miatt jó szívvel ajánlható. Akváriumát telepítsük be sok növényvel, uszadékfával, kisebb sziklával, de azért hagyjunk számára megfelelő méretű kiúszóteret is. A faj kifejezett ugróbajnok, úgyhogy akváriumát alaposan takarjuk le. Pihenéskor jellegzetesen ollózva mozgatja farokuszóját.

Élelmezése könnyen megoldható: mindenféle élőeséget szeret, de száraz tápok és a fagyasztott eleséget is elfogadja. A vadon élő példányok kitűnő felszíni rovarvadászok, ezért meg lehet őket kínálni apróbb rovarokkal, mint a *Drosophila*.

A víz minőségével szemben sincsenek túl nagy igényei, társasakváriumban sima csapvíz is megfelelő számára, de azért a megfelelő szűrésről sem szabad megfeledkeznünk, ugyanis nem csak a tiszta bomlástermék mentes vizet, de a természetes élőhelyén megszokott lassú áramlást is kedveli. A hőmérsékletet 23-26°C-ra állítsuk be.

A jól élelmezett (kondicionált) és megfelelő korú halak néha leívnak társasmedencében is, de ilyen körülmények között csak kisszámú ivadék túlélése lehetséges. Ha nagyobb számú utódot szeretnénk, szükségünk lesz egy hosszúkás (120x30x30 cm-es, 113 literes) akváriumra, melyet csak körülbelül félig töltünk fel vízzel. A megvilágítást mellőzzük, vagy csak igen gyenge legyen. A tenyésztő víz jellemzői: lágy 2-6°Nk, a pH 6-6,5 kissé savanyú, 26-28°C-os. A tartály aljára helyezzünk el lehetőleg nagyszemű, sötét színű ikrahálót, műfüvet (!), vagy sötét mogyoró nagyságú kavicsaljzatot, mert a felnőttek előszeretettel lakmároznak az ikrából. Sűrűn ültessünk finom szálú növényeket, mert ezek között rakják le ikráikat.

Gondoskodjunk egy motoros és egy szivacsszűrőről is. A motorost íváskor a megfelelő víz áramlás előállítása kedvéért használjuk, de amint a lárvák kikelnek, le kell állítanunk, nehogy a kis halakat beszívja. Ide helyezzünk ki az esti órákban 1 vagy 2 párból álló csapatot. Az ívást elindítani néhány óránként hozzáadott kis mennyiségű hideg vízzel is lehetséges, addig, amíg az akvárium teljesen fel nem töltődik.

Az ívás megkezdődése több napig is elhúzódhat és egy két próba ívás vezeti be. Ha hosszabb idő eltelik, akár még etetnünk is kell a tenyészhalakat, de csak nagyon óvatosan és keveset. A nőtények nagyon produktívak, akár 1000 ikrát is lerakhatnak.

Az ikrákból a lárvák 24-28 óra múlva kelnek ki és 3-5 nap múlva úsznak el a kishalak. Az ikrák és a kishalak is érzékenyek az infuzóriára. Indítóeleségnek adjunk frissen kelt sórák naupliusát.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Háromcsíkú razbóra;

syn: *Rasbora stigmatura*.

Eng: Three-lined rasbora, Black scissortail, Scissor-tail, Scissor-Tailed rasbora, Scissorfish, Scissortail, Scissortail rasbora, Threeline rasbora .

Egyéb köznevei: Rasbora třílinková skleněná, Razbora průsvitná, Razbora třípruhá, Saksehale, Sakshalerasbora, Saksipyrstö, Saksipystö, Dreiliniénrasbora, Glasrasbora, Trey changwa poht, Bada, Pantau bana, Seluang, Seluang engkrunyuk, Seluang minyak, Razbora szklista, Trekhlineinaya rasbora, Saxfisk, Siew hang dok .

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1870](#), [Ollófarkú razbóra](#), [Rasbora trilineata](#), [Steindachner](#)

JELLEMZŐK:

[féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [középső szint](#), [Thaiföld](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Borneó](#), [igenlágymízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágymízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [nagymeretű 10-20 cm](#), [Vietnám](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [közepesmeretű akvárium 50-100 literig](#), [Ázsia](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Indonézia](#), [mindenevő](#), [Szumátra](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-09-04 14:58:47

Katalógus ID: 3944

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasbora-trilineata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva