

Rasboroides vaterifloris - Pompás razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Deraniyagala, 1930
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	24-27
pH°:	6-7,5
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	alacsony rizikófaktorú



Rasboroides vaterifloris
Pompás razbóra
 (Deraniyagala, 1930)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rasboroides vaterifloris – Pompás razbóra elterjedési területe (Map)



Srí-Lanka hegyi patakjainak endemikus faja.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Alakja hasonlít a [T. heteromorphá](#)éhoz, de nincs rajta a háromszögletű folt. A függőleges úszók meglehetősen nagyok, az oldalon nagyon rövid. D 10, A 8. Hosszúság kb. 4 cm.

Színezet és ivarikulönbségek: Színe lehet tüzes orgona, rózsá-, kék-, zöldes vagy gyöngyházfényű, a test alsó fele és az úszók szép aransárgák vagy narancsvörösek. A hím karcsúbb, színezete élénkebb, mint a nőstényé.

Szürke színű tenyésztörzs is létezik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hőmérséklet-igénye 24— 27 °C. Gondozása hasonló a T. heteromorpháéhoz. Szereti a tompa világítást, ezért ajánlatos a víz tükrét úszónövényekkel lefedni. A sötét talaj egyaránt biztonságérzetet ad neki, színeit kiemeli. A vizét sötétíthetjük is, például tőzegkivonattal.

Lehetőleg ne zavarjuk, félénk halak, nem szeretik az olyan medencét, ami előtt folyamatos mászkálás, ajtónyitogatás van.

Csapatlak, minimálisan 6 egyedre kell együtt tartani, különben pláne félénkek lesznek! Továbbá még a bujkálásra alkalmas növényzetet is kedvelik, kevés kiűszótérre van szükségük.

A megfelelő szűrésre ügyelni kell, és vizét is rendszeresen cseréljük részlegesen, kéthetente kb. 25%-ot.

Társítani más békés halakkal lehet, biotópikusan például törpe gurámi, leopárdcsík, színjátészó dánió kerülhet mellé, de vegyes medencében plattik, pontylazacok, páncélosarcsák is megfelelő társai lehetnek.

Nem kezdők legszerencésebb választása, de némi gyakorlat után már gonoszhatóak.

Etetésükre fagyasztott és élő eledel a legjobbak, de száraz táppal is etethetünk. Ha pompás színeket szeretnénk, akkor mindenképpen kapjanak élő/fagyasztott tápot, például artémiát, száraz tápból pedig a magasabb karotinoid vagy antioxidáns tartalmú színeledeleket válasszuk!

A faj tenyésztése nem egészen egyszerű. A tenyésztéshez alacsony vízszintű medencét használjunk, az aljára sok kavicsot és finoman tagolt növényeket tegyünk. Erre főleg a Nitella, a forrás- vagy a jávai moha, netán zöld műanyagfonalak alkalmasak. Az így elkészített aljzat a lesüllyedő ikrákat megvédi a szülők falánkságától.

Az ívási aktus lefolyása általában hasonlít a dániókéhoz. Akárcsak a dánióknál, itt is tehetünk egy nőstény mellé több hímre. Az ívás gyakran a hajnali napsütésben zajlik le. Az ivadékok felnevelése általában nem nehéz. 1-2 nap után kikelnek és további 3-5 napon belül elúsznak, ezután Paramecium-mal indíthatjuk őket, de amint elfogadják artémia naupliákkal, walterféreggel is folytathatjuk etetésüket. A vízcserékre ügyeljünk náluk is, a víz elinfusoriásodását el kell kerülni!

A különböző ivarú egyedeket különítsük el mindaddig, amíg az ívás közeledte világosan nem látszik. Etessük őket addig változatosan. A nevelő medencében a hőmérséklet legyen állandóan kb. 26 °C.

Akár 6 párt is ívathatunk egyszerre. Egyes tenyésztők alig 10-15 cm magas vízszlopot használnak e halak ívatásához!

Több alfaját is megkülönböztetjük, melyek különböző színekben és élőhelyeken fordulnak elő, például Rasboroides vaterifloris vaterifloris (Kalu folyó), R. v. ruber (Bentota folyó), R. v. pallida (Gin folyó), R. v. rubriculis (Nilwala folyó). Az akvarisztikában sajnos csak ritkán beszerezhető e faj.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Rasbora nigromarginata*, *Rasbora vaterifloris*, *Rasbora vaterifloris pallida*, *Rasbora vaterifloris ruber*, *Rasbora vaterifloris rubiocularis*, *Rasbora vaterifloris typica*.

Eng: Pearly rasbora, Flame rasbora, Golden rasbora.

Egyéb köznevei: Razbora perleťová, Perlemor-rasbora, Perlemorsrasbora, Helmiäisrasbora, Blauer Perlmutterbärbling, Perlmutterbärbling, Hal mal dandiya.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Deraniyagala, 1930](#), [Akváriumi halak](#), [Pompás razbóra](#), [akvarisztika](#), [Rasboroides vaterifloris](#)

JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [Ázsia, félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-Ázsia, hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [sárga vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Sri-Lanka](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-19 19:38:06

Katalógus ID: 3945

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/rasboroides-vaterifloris.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva