

Salvinia auriculata - Füles rucaöröm

ELSŐ LEÍRÓJA:	Aublet
CSALÁD:	Salviniaceae
MAGASSÁGA:	8-10 cm
C°:	20-27
pH°:	5-8
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	50 liter
TALAJTÍPUS:	úszónövény
TÁPANYAG:	közepes, levelén
ÜLTETÉS:	vízfelszín
FÉNYIGÉNYE:	közepes
TERM.VÉD.:	felméretlen



Salvinia auriculata
Füles rucaöröm
(Aublet)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél- és Közép-Amerika állóvizeinek és folyó holtágainak a színén széles, sűrű telepeket alkot.

Széles körben elterjedt, megtalálható többek között a következő országokban: Mexikó, Puerto Rico, Kuba, Hispaniola, Galapagos-szigetek, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, valamint Dél-Amerikában Guyana, Francia Guyana, Suriname, Trinidad, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia, Brazília, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile.

Biotópidegen populációit behurcolták Ausztráliába,
Zambiába, Zimbabwéba, Kongóba,
Spanyolországba és Németországba is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

10 cm hosszúságig fejlődő hajtástengelyének két oldalán kisebb, ovális alakú, világoszöld levelei helyezkednek el. Egy-egy levél kb. 2 cm-es nagyságú. Mintegy harmadik sor levélként ez alatt lógnak sűrű rojtokban a gyökérszerűen módosult rhizophyllumai.

A páfrányok közé tartozik, azoknak egy rendkívül különlegesen módosult csoportját képviseli. Egyes levelei a felszívásért felelős gyökérszerű képződményekké módosulnak. Fontos megemlíteni, hogy leveleik felszínén úgynevezett habverőszőröket találunk, melyek vízhatlanítják a levelet (ún. szuperhidrofób leveleket képeznek).

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Melegvizű akváriumok igen kedvelt úszónövénye. Kedveli a sok fényt és a 20-25 C°-ú vizet. Levelei igen érzékenyek a rájuk hulló vízzel szemben, ezért a fedőüveget lejtősen fektessük fölé. Óriási előfordulási helye szerint leveleinek formája változó; ezeket gyakran formaként írják le. Így pl. egyik nagy úszólevelű alakját *forma olfersiana* (Klotzsch) néven terjesztik a vízi-kertészetekben.

Életkörülményei szerint is változtatja habitusát. Például a magas hőmérsékleten, kevés fényben nevelt példányainak levelei aprókká és lekerekítettekké válnak. Szaporítása sarjhajtások leválasztása révén történik, indaszerű képződményeket növeszt. Sűrű úszó telepei a medence felső leárnýékolását szolgálják (a közvetlen fénysugarakat kerülő halaknál kívánatos!) és kitűnő ikrázási aljzatot nyújtanak a felszín közelében ikrázó halfajoknak, s kedvező védelmet a kikelő halivadéknak.

Egyes növényevő halak (pl. tányérlazacok) nagyon szívesen fogyasztják, nagy mennyiségben képesek pusztítani. Nyáron dézsában, műanyag ládában a kertbe is kihelyezhető, ahol gyorsan elszaporodik (ilyen ládákban eleve szülő fogaspontyokat is kihelyezhetünk, melyek levelei közt remekül szaporodhatnak). Külön tápozást akváiumi tartása során nem igényel.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Úszó rojtpáfrány

syn: *Marsilea auriculata*, *Marsilea natans*, *Salvinia affinis*, *Salvinia hispida*, *Salvinia olfersiana*, *Salvinia radula*, *Salvinia rotundifolia*

Eng: Eared Watermoss.

Egyéb köznevei: Nepukalka ouškatá, Flydende Bregne, Salvinie auriculée, Salvinia à oreillettes, Salwinia uszkowata, Büschelfarn, Rundblättriger Schwimmfarn, Acordeón de agua, Helecho mariposa, Simbräken, Plávajúce vodné paprad.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Amerikai növények](#), [Akváriumi növények](#), [Aublet](#), [Füles rucaöröm](#), [Salvinia auriculata](#), [Salviniaceae](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Közép-Amerika](#), [úszónövény](#), [Orinoco](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [trópusi](#), [közepes tápanyagigényű](#), [Guyanák](#), [átlátszó vízi](#), [fekete vízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Andok orsz.](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [állóvízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [gyors növekedésű](#), [Amazónia](#), [Peru](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Argentína](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [Déli kúp](#), [kicsi \(kisebb 20 cm-nél\)](#), [barna vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [Paraguay](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [Dél-amerika](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Ecuad.-Kol.](#), [lágyművi és szár](#), [tengerparti](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Bolívia](#), [Amerika](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [sárga vízi](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [Chile](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Thierry Maitre-Allain: **Nagy akvarista kézikönyv**

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/362faccab8f167ebff3a1668766652fd>

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-05-02 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-03-22 09:54:17

Katalógus ID: 5096

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/amerikai-novenyek/salvinia-auriculata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva