

## Satanoperca acuticeps - Hegyesképű földdevő sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Heckel, 1840
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15-18 cm
C°:	24,0-26,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	6,0-16
HELYIGÉNY:	400 liter
VISELKEDÉS:	harcias
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Satanoperca acuticeps**  
*Hegyesképű földdevő sügér*  
 (Heckel, 1840)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika egész trópusi övében, délen egészen a *La Plata*-vidékig el van terjedve.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test hosszúkasan tojásdad, oldalt erősen lapított, főleg az elülső testrésze viszonylag magas. A homlokvonal a hátúszó kezdetéig meredeken emelkedik, a hátvonal ellenben eléggé kis lejtésű. A fej nagy, az orr hosszú és hegyes, a szájrés igen nagy.

A farkúszó külső pereme majdnem egyenes, egy kissé befelé hajló, a mellúszók igen nagyok, a hasúszók erősen megnyúltak. A hím hát- és fark alatti úszója begyben végződik.

Hosszúsága akár 25 cm is lehet, de 8— 10 centiméteresen már ivarérett.

Zöldes alapon három kerek, fekete petty látható; a pikkelyek töve ezüstös fényű, a fej két oldalán világító zöld vonalak és foltok vannak. Az úszók zöldesek-barnásak, a megnyúlt hasúszók sárgák. A nőstény valamivel kevésbé színes.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagy termete miatt a *Satanoperca* - vagy régebbi nevén (*Geophagus*) - nem nagy medencét igényel, ugyanolyan berendezéssel, mint a többi bölcsőszájú hal esetében. A "földfaló" elnevezés a halaknak arra a szokására vonatkozik, hogy a talajban táplálékállatok után kutatnak, s ezeket nagy „szuszogással” kiássák. Egyes fajok, a dél-amerikai bölcsőszájú halak többségének szokása szerint gondolják ivadékukat, mások szájköltők, ismét mások pedig állítólag — legalább veszély idején — a szájukba szedik utódaikat.

A bölcsőszájú halak közül a *Satanoperca acuticeps* egyike a legjobban túró fajoknak; megfelelő rejtőzési lehetőséget nyújtó, nagy medencékben azonban igen mutatós.

Ugyanúgy szaporodik, mint a gödörben költő többi *Cichlida*.

Érdemes kisebb 5-6 egyedes csapatban tartani. Jól társítható más sügérfélékkel, mivel nem agresszív!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Geophagus acuticeps*.

**Eng:** Sharphead eartheater, Sparkling Earth Eater, Sparkling Geophagus.

**Egyéb köznevei:** Spidshovedet jordspiser, Vihertonkija, Spitzkopf-Perlmuttercichlide, Vierfleckerdfresser, Acará bicudo, Acará papa terra.

## KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Heckel](#), [Akváriumi halak](#), [1840](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Hegyesképű földevősügér](#), [Satanoperca acuticeps](#)

## JELLEMZŐK:

[Argentína](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [barna vízi](#), [Peru](#), [közepesen áramló vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-amerika](#), [Déli kúp](#), [lassan mozgó vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [sárga vízi](#), [Paraguay](#), [közepesen aktív mozgású](#), [alsó szint](#), [Ecuad.-Kol.](#), [középső szint](#),

[lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Orinoco](#), [Bolívia](#), [lassú mozgású](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [Guyanák](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [ragadozó](#), [fekete vízi](#), [Amerika](#), [állóvízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [Andok orsz.](#), [átlátszó vízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2010-12-06 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2013-11-12 08:22:57

**Katalógus ID:** 4320

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/amerikai-fajok/satanoperca-acuticeps.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/satanoperca-acuticeps.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva