

Scardinius erythrophthalmus - Vörösszárnú keszeg

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	15-18 cm
C°:	0-20
pH°:	7
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	450-550 liter liter
VISELKEDÉS:	társas, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	5-7 év
TERM.VÉD.:	



Scardinius erythrophthalmus

Vörösszárnú keszeg
(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Scardinius erythrophthalmus – Vörösszárnú keszeg elterjedési területe (Map)



Euráziában közönséges hal, hazánkban is gyakori, korlátozás nélkül fogható hal.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Enyhén magas hátú, laposabb testű faj. Pikkelyei ezüstösek, úszói vörösek, nevét is erről kapta.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kerti tavakban ritkán tartják, inkább arany színváltozata terjedt el. Hazai akváriumba alkalmas lehet, mert nem túl igényes, egy külső szűrő elég neki, bár az áramlást kedveli. Kisebb mérete miatt kisebb

medencébe is megfelel, bár úszásigénye azért van, hagyjunk neki elég kiúszóteret. Néhány ággal és kövekkel dekoráljunk, növényeket is ültessünk, de erősebb fajokat. Általános tavi tápokát elfogad, igénytelen faj. Nem jelent ezért gondot tavi tartása sem.

Halászati, horgászati jelentősége kevés, leginkább csalihalnak használatos. Akár 100 ezer ikrát is rakhat, de csak mesterséges körülmények közt tenyésztik, pl. hipofízissel, akváriumban nem szaporodik. A természetben a bodorkával összeívhát.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cyprinus caeruleus*, *Cyprinus compressus*, *Cyprinus erythrophthalmus*, *Cyprinus erythrops*, *Cyprinus scardula*, *Leuciscus apollonitis*, *Leuciscus caeruleus*, *Leuciscus erythrophthalmus*, *Scardinius crocophthalmus*, *Scardinius erithrophthalmus*, *Scardinius eruthrophthalmus*, *Scardinius erythrophthalmus achrus*, *Scardinius erythrophthalmus dojransensis*, *Scardinius macrophthalmus*.

Eng: Pearl roach, Redeye, Rudd.

Egyéb köznevei: Çafri, Lloska pendëkuqe, Chervenoperka, Cervenica, Červenice, Almindelig Rudskalle, Rudskalle, Rietvoorn, Roosärg, Sorva, About, Gardon carpe, Gardon de roche, Gardon rouge, Louzou, Plate, Platitude, Rossard, Rotengle, Rotengle, Förm, Förn, Gelbauge, Kotaschel, Kümmerer, Nersling, Rodde, Roddow, Rohrkarpfen, Rötél, Rotfeder, Rouflöbchen, Κοκκινόφτερά, Κοκκινόφτερίτσα, Scardola, КЫЗЫЛ КАНАТ, Rudulis, Raude, Dojranska letnica, Sorv, Sørv, Søv, Sorkh Baleh, Sorkh Pareh, Wzdrega, Wzdrega a. krasnopiórka, Rosioara, Roşioară, Крaснoпepкa, Krasnoperka, Crvenperka, Cervenica obycajná, Rdeceperka, Escardinio, Gardí, Sarv, Kizilkanat baligi.

KATEGÓRIÁK:

[Hazai halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cyprinidae](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Hazai halfajták](#), [Scardinius erythrophthalmus](#), [Vörösszárnú keszeg](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-19 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-09 08:42:03

Katalógus ID: 4407

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/hazai-halak/scardinius-erythrophthalmus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva