


Systemus asoka - Asoka díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kottelat, 1989
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	17 cm
C°:	24-28
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	5,0-15,0
HELYIGÉNY:	300 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett


Systemus asoka
Asoka díszmárna

(Kottelat, 1989)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Systemus asoka – Asoka díszmárna elterjedési területe (Map)

Sri Lanka folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezt a díszmárna alfajt 1989-ben fedezték fel. Hosszúkás testét sárgás alapon sötétszínű pontsorok díszítik, melyek a pikkelyek tövén található foltokból adódnak, a faroknyélen kiegészítve egy nagyobb sötét folttal. Úszói narancsárnyalatúak, farokúszója külső sugarai pirosak, orra kissé elsötétedik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Eredeti élőhelyén gyors folyású, viszonylag mély patakokban él, a fiatal példányok a part menti sekély (5-25 cm) területeken tartózkodnak szívesen, 30-100 fős csapatokban, míg a felnőttek a mélyebb részeket

kedvelik (1-2m). Kitűnő úszó, ezért nagyobb medencében tartsuk. Szereti a napfényt, élőhelyén leginkább árnyékmentes helyeken találták meg. Akváriuma mindenképpen hosszú legyen, és sok kiúszóterrel rendelkezzen. Külső szűrő használata szükséges lehet, hasonló nagyobb termetű pontyfélékkel remekül társíthatjuk! Kerüljük lassú, nyugodt halakkal történő társítását, mint amilyen a vitorláshal vagy a gurámik.

Etetése nem problémás, elfogadja a műeledeleket, de célszerű élő és/vagy fagyasztott tápokkal táplálni. Ez különösen tenyésztés előtt hangsúlyos, amikor megfelelő kondícióba akarjuk hozni állatainkat.

A rendszeres frissítő vízcseréről ne feledkezzünk meg, nem viseli jól a nitrátos vizet. Kövekkel, ágakkal dekorálhatunk. Mindenképpen rajban tartsuk, ami 6-8 állatot jelent legalább. A természetben ugyan 17 cm-re is megnőnek, akváriumban a 10-12 cm-t ritkán haladják meg!

Párban és csapatban is ívatható, de mindenképpen tágas helyre van szükség ilyenkor is. Ikráit szabadon szórja, általában a felkelő Nap sugarai alatt. Mivel ikrafaló, ívatórács használata ajánlott. A medencébe lágy és semleges közeli savasságú vizet töltsünk. Ikrarakás után a lehető leggyorsabban távolítsuk el a szülőket. A kishalak néhány nap alatt kikelnek, és még kb. 3-4 napig a szikzacskójukból élnek. Amint ez felszívódott, elkezdenek vadászni a vízközt, ilyenkor megkezdhetjük táplálásukat apró élő eledelekkel, mint amilyen a frissen kikelt artémia is.

A vadonbéli állománya sajnálatos módon veszélyeztetett, a faj megóvása fontos feladat! Az akvarisztikában meglehetősen ritkán látott faj.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Barbichthys asokae*, *Barbus asoka*, *Puntius asoka*.

Eng.: Asoka barb

Egyéb köznevei: Parmička sitavacká, Parmička asoka, [?][?][?][?], Asoka pethiya, Asokabarbi

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [1989](#), [Asoka díszmárna](#), [Kottelat](#), [Akváriumi halak](#), [Systemus asoka](#), [akvarisztika](#), [Cyprinidae](#)

JELLEMZŐK:

[hosszú életű 6 év fölött](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Sri-Lanka](#), [átlagos növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagyon aktív mozgású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 12:00:32

Katalógus ID: 3965

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/systemus-asoka.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva