Thorichthys meeki - Vöröstorkú sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Brind, 1918
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	26,0-30,0
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	6-10
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Thorichthys meeki
Vöröstorkú sügér
(Brind, 1918)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:









Guatemala és a mexikói Yucatán folyói, patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Meglehetősen magas, oldalt nagyon lapított. A fajra jellemző a meredeken emelkedő homlok, az egyenes hasvonal és a viszonylag nagy, hegyben végződő fej. A szájpadlás izgalmi állapotban lesüllyedhet. Az úszók viszonylag magasak, a farkúszó enyhén befelé hajló, a hím függőleges úszóinak külső sugarai nagyon hegyesek vagy meghosszabbodottak. A sarló alakú mellúszók meglehetősen nagyok. 10 cm hosszú, s igen nagy medencékben még hosszabbra is megnő; a nőstény valamivel kisebb. Zöldes-ibolyaszínű, sötét szegélyű, gyengén fénylő pikkelyek, s sötét, néha eltűnő keresztsáv-rajzolat díszítik. A kopoltyúfedőkön egy sötét folt zöldes-aranysárga szegélyű, a torok és a mell élénkvörös színű, a szivárványhártya fényeszöld. Az ivarok nem feltűnők, a nőstény néha ugyanolyan színezetű, mint a hím.

A költésidőben a nőstény torka és a kopoltyúfedőt borító hám néha fehéres, egy kis zöld csillogással. A test alapszíne barnásszürke, pikkelyei jól láthatók. A hátúszó és a farok alatti úszó alapja hosszú és a hímeken csúcsuk kihegyezett.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása és tenyésztése mint a gödörben költő többi bölcsőszájú halé. Az egyik legszebb és legérdekesebb faj. A vöröstorkú bölcsőszájú hal nem agresszív, nem nagyon bántja a többi halat. A berendezést, növényeket sem rongálja, ha elég szilárdak és jól meggyökeresedtek. Hőmérséklet: 25-26 C°.

Gyakran kapható, kedvelt, aránylag békés, jól társítható amerikai bölcsőszájú hal. Nemének több faja kapható újabban, néha, már-már egyes helyeken ódivatú halnak tartják, és bár az utóbbi években beszerezhetőségi lehetőségei egy picit csökkentek, még mindig közkedvelt fajnak minősül, kezdőknek ajánlható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cichlasoma hyorhynchum, Cichlasoma meeki, Herichthys meeki, Thorichthys helleri meeki.*

Eng: Firemouth, Firemouth cichlid, Redbreasted cichlid.

Egyéb köznevei: Panya gial, Vuurkeelcichlide, Tulisuu, Feuermaulbuntbarsch, Rotbrust-Buntbarsch, Pielegnica Meeka, Krasnogorlaya tsikhlasoma, Castarrica, Mojarra boca de fuego, Rojita, Eldbuk.

KATEGÓRIÁK:

Amerikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:

1918, Cichlidae, Amerikai bölcsőszájúhalak, Akváriumi halak, Brind, akvarisztika, Thorichthys meeki, Vöröstorkú sügér

JELLEMZŐK:

nagyméretű 10-20 cm, normál (6.5-7.5 pH), átlátszó vízi, állóvízi, alsó szint, közepesen áramló vízi, barna vízi, békés viselkedés, lassan mozgó vízi, tengerparti, lágyvízi (5-10 Nk°), közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső szint, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, Amerika, lassú mozgású, Közép-Amerika, normálméretű akvárium 100-200 literig, hőigényes (25-30 °C), trópusi.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-12 08:43:32
Katalógus ID: 4233
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/thorichthys-meeki.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva