


Trichogaster fasciata - Szivárványos gurámi

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bloch & Schneider, 1801
CSALÁD:	Osphronemidae
MÉRET:	10 cm
C°:	22-28
pH°:	7-7,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Trichogaster fasciata
Szivárványos gurámi
(Bloch & Schneider, 1801)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Trichogaster fasciata – Szivárványos gurámi elterjedési területe (Map)



Dél-Ázsiában széles körben elterjedt, élőhelyéhez tartozik Pakisztán, Banglades, India, Nepál és Mianmar is. Megtaláljuk folyókban, tavakban, kisebb vízfolyásokban, elöntött rizsföldeken is, általában dúsabb vegetáció közelében.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A 'törpe gurámik' formakörén belül viszonylag nagy termetű faj a maga akár 10 cm-es kifejtett kori hosszával. A nőtények jellemzően kisebbek maradnak. A száj kicsiny, az ajkak vastagok, duzzadtak, a pikkelyek viszonylag nagyok.

Az alapszín vöröses vagy barnás, amelyen kékeszöld keresztsávok futnak ferdén hátrafelé. A kifejlett hímek sávjai és torka ragyogó türkizkék színű, míg a nőstény torka ezüstös, neki az alapszíne is jóval világosabb, és csíkjai is halványabbak, vékonyabbak. A kopolytűfedők, a mell és a has fényes kékeszöld, az úszók is élénk színűek. A feltűnő hasúszók mindkét ivaron fonalszerűek, de a hímeké fényesebb. A nőstény színei egyszerűbbek. A hátúszó inkább szürkésebb tónusú, bázisa pirosas. Fontos bélyeg, hogy külső szegélye fehér színű. A farkúszó a hímeknél piros, kék pettyekkel tarkítva, a nőstényé általában színtelen vagy gyenge színezetű. A farok alatti úszó türkizkék, külső szegélye pedig izzó vörös!

Összetéveszthető az ajakos gurámmal (*Trichogaster labiosa*), mely szintén barnásabb alapszínen türkiz csíkokkal mintázott. Az ajakos gurámi azonban robusztusabb, erősebb felépítésű, kevésbé nyúlánk, színei tompábbak. Nála a farok alatti úszó nagyobb részben vöröses, majd egy vastag kék sáv következik, míg szegélye vékonyan piros-sárga, mely az úszó hátulsó harmadában eltűnik. A hátúszó külső szegélye itt sárgás. Az egyik legfontosabb megkülönböztető bélyeg azonban, hogy az ajakos guráminál a farok alatti úszó szépen lekerekített, míg a szivárványos gurámi esetében a farok alatti úszó is hegyes csúcsban végződik!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A szivárványos gurámi egy könnyen tartható, mutatós küllemű gurámifaj, mely ennek ellenére kevésbé terjedt el az akvarisztikában. Nemének legnagyobb termetű faja, egy jól fejlett hím akár 10 cm-es hosszt is elérhet. Közele rokonaihoz képest kicsit temperamentusabb, de ettől eltekintve békés természetű. Jól társítható más kisebb-közepesebb fajokkal, így például daniókkal, razbórákkal, békésebb díszmárnákkal, arra azonban ügyeljünk, hogy csipkelődős fajok mellé ne kerüljön, melyek kárt tesznek érzékeny tapogatóvá módosult hasúszóiban. Vegyes társas akváriumokba is kerülhet, melyek körülményeihez jól tud alkalmazkodni. Ne tartsuk együtt ajakos gurámmal (*Trichogaster labiosa*), mert kereszteződhetnek.

Egy pár számára egy 75-80 literes akvárium már elégséges, de ha több hím is szeretnénk tartani, akkor legalább 100 literbe kerüljenek. Nem szereti a túl erős áramlást, élőhelyén is inkább a folyók nyugodtabb szakaszain, tavakban, összefüggő időszakos víztestekben, elöntött rizsföldeken tanyázik. Sokszor figyelhető meg dús vízinnövényzet közelében, ezt akváriumában is érdemes megvalósítani, de arra ügyeljünk, hogy elegendő szabad úszótere is maradjon. Színeit és biztonságérzetét is fokozhatjuk úszónövényekkel, sötétebb tónusú háttérrel. Gallyakkal, uszadékokkal dekorálhatunk.

A vízminőségre sem kényes, a semleges kémhatású, lágyabb-középkemény vízben is remekül gondozható. A savas kémhatást nem kedveli, és kimondottan lágy vizet sem igényel! A hőmérséklettel szembeni tűrőképessége nagyon jó, ez abból is következik, hogy élőhelyén hatalmas hőingásoknak van kitéve. Jegyeztek már fel adatokat arról is élőhelyén, hogy nap közben 30 °C-ig is felkúszott a hőmérő higanyszála, míg éjjel 20 °C-ra hűlt. Téli időszakban 15 °C-ig is lehűlhet a víz, de napközben 20 °C környékére felmelegszik. Akváiumi tartása során sem kell medencéjét túlfűteni, 24-25 °C hosszú távon is jól megfelel igényeinek, de ha nem hűl ki lakásunk túlságosan, akkor akár még fűtetlen szobai akváiumban is tartható, amivel akár az évszakos hőingást is kismértékben tudjuk modellezni, de

lehetőleg tartósan 20-22 °C alá ne hűljenek le (a hideg víz elősegítheti egyes paraziták, pl. a darakór megjelenését). Etetése sem jelent problémát, általában a száraz tápokat is megesszik, de ezt kiegészíthetjük szokásos fagyasztott és élő eledelekkel, tenyésztése előtt utóbbi mindenképpen javasolt.

Szaporítása nem nehéz, a nemek könnyedén megkülönböztethetőek. Habfészeképítő, a hím készíti el, növényi anyagot csak ritkán használ fel hozzá. Nagyobb termetűknél fogva akár több száz ikrát is rakhatnak. A szaporító akváriumba töltsünk semleges kémhatású, 6-12 nk-s vizet, ilyenkor viszont érdemes a hőmérsékleten emelnünk, akár 28 °C közelébe. A tenyészakvárium vizéhez adjunk valamennyit eredeti tartóvizükből is. Helyezzünk bele sok vízinövényt, falevelet, melyek búvóhelyként szolgálnak. A vízáramlás csak nagyon csekély legyen, például egy alacsony fokozattal működő szivacs szűrő formájában, de ezt akár ki is hagyhatjuk. A medence fedele záródjon jól, hogy a majdani szaporulat labirintszerve jól fejlődhessen. A tenyészakváriumban a vízszint legyen alacsony! A szülőket ívatás előtt 1-2 hétig érdemes külön tartani. Az ívás során a hím átöleli a nőtényt, kiszorítva belőle ikráit, melyeket egyből megtermékenyít, majd a habfészekbe hord. A hímek agresszívek lehetnek a nőtényekkel, utóbbiakat érdemes az ívás után eltávolítani. A hím a kishalak elűzésáig velük maradhat, őrzi a fészket. A kishalak kb. egy nap alatt kikelnek, további kb. 2-3 nap szükséges elűzésükhöz. Indítani akár már frissen kelt artémiával is próbálkozhatunk, illetve porszemcse finomságú tápot, mikro férgeket, papucsállatkát kaphatnak. Rendszeres vízcserét igényelnek, és napi többszöri etetést, tágas helyen jó tempóban növekednek. Az első néhány hét után már jellemzően nem kényesek, de az ivarok csak több hónap után látszanak jól. Élőhelyén fagyasztják a fajt.

A faj rendszertani helyzete jelenleg gyakran képezi vita tárgyát. Néhány szakértő elismer egy ötödik fajt is a nemzetségben, *Trichogaster bejeus* (vagy *Colisa bejeus*) néven. E faj rendkívül mértékben hasonlít a szivárványos gurámira, a leírások szerint valamivel kevésbé színes, inkább szürkés tónusú, viszont hevesebb, agresszívebb természetű. Mások e halakat csak területi variánsként kezelik. Tovább nehezíti a problémát, hogy számos, a szivárványos gurámira nagymértékben hasonlító hal került elő az elmúlt években India vagy Ázsia egyéb területeiről, melyek kisebb különbségekkel is bírnak. Míg egyes kutatók úgy vélik, mindez csak a széles körben elterjedt faj nagymértékű variabilitásának tudható be, megint mások azt gyanítják, hogy több, leíratlan fajjal van dolgunk. Közéjük tartozik a '*Colisa cf. fasciata*', melyről az egyik német importőr cég számolt be 2009-ben. E halak teste elnyújtottabb, fejük zömökebb, hátúszójuk elülső fele kevésbé fejlett, míg hátulsó része megnyúlt, már-már a paradicsomhalra emlékeztető. Ezek a példányok több vörös színt is mutatnak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Csíkos gurámi

syn: *Colisa fasciata*, *Colisa fasciatus*, *Colisa ponticeriana*, *Colisa vulgaris*, *Colisha fasciatus*, *Polyacanthus fasciatus*, *Trichogaster fasciatus*, *Trichopodus bejeus*, *Trichopodus colisa*, *Trichopodus cotra*.

Eng: Banded gourami, Giant dwarf gourami, Giant gourami, Rainbow gourami, Striped gourami.

Egyéb köznevei: _____

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1801](#), [Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [akvarisztika](#), [Belontiidae](#), [Szivárványos gurámi](#), [Trichogaster fasciata](#), [Bloch](#)

JELLEMZŐK:

[sűrű növényzetigényű](#), [állóvízi](#), [barna vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Ázsia](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [lassan mozgó vízi](#), [Indokína](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [India](#), [békés viselkedés](#), [felső szint](#), [Nyugat-Ázsia](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Pakisztán](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Myanmar](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**
- Horst Linke: **Labyrinthfische**
- <https://www.seriouslyfish.com/species/trichogaster-fasciata/>
- https://www.aquariumglaser.de/en/fish-archives/_en-41/

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-18 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-08-28 14:20:17

Katalógus ID: 4246

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/trichogaster-fasciata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva