

Trichopsis vittata - Morgó gurámi

ELSŐ LEÍRÓJA:	Cuvier, 1831
CSALÁD:	Osphronemidae
MÉRET:	6 cm
C°:	25-28
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, kissé félnék
TÁPLÁLÉK:	mikroragadozó
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-5 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Trichopsis vittata

Morgó gurámi

(Cuvier, 1831)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Trichopsis vittata – Morgó gurámi elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia szerte elterjedt. Dél-Kínától kezdődik élőhelye, melybe beletartozik Laosz, Vietnam, Kambodzsza, Thaiföld, Mianmar, Szingapúr, valamint Malajzia és Indonézia szigeteinek jelentős része. Közülük is kiemelkedő Jáva, Szumátra és Borneó. Előnyben részesíti a kisebb tavakat, mocsarakat, elöntött rizsföldeket, ártereket, csatornákat és kisebb folyókat, főleg, ahol dús a növényzet.

A Fülöp-szigetekre, Indiába és az USA-ba betelepítették, ahol egyes helyeken önfenntartó

populációi lettek.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal teste többnyire karcsú, de a hátúszó előtti hátszakasz magasabb felépítésű. Arcorra hegyes, előrenyúló, a legtöbb gurámifajhoz képest kiugróbb. Alapszíne szürkés - aranybarnás, de rendkívül sok színárnyalatban játszhat. Alapesetben 4 hosszanti sötétbarnás-feketés sáv húzódik testén. Ezek közül a legfőbb csík az oldalvonal mentén fut, valamint hangsúlyos a farok alatti úszó bázisánál lévő.

Az oldalvonal fölötti csíkok halványabbak, néha nem is jól kivehetőek. _____

Az ivarok megkülönböztetése nem egyszerű. A hosszan megnyúlt, színesebb úszók általában kifejtett hímekekre vonatkoznak. A rokon fajoktól egyértelműen megkülönböztethető, ha látszik a kopolytű mögötti fekete folt, ez azonban sok esetben rejtve marad. A 3-4 jól látható csík szintén faji bélyeg, közülük is a farok alatti úszó mentén húzódó a *Trichopsis vittata*-ra utal. A többi morgógurámi-faj kisebb marad.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A morgó gurámi Délkelet-Ázsia szerte elterjedt, kis testméretű hal. Gondozása könnyű, akár már kezdő akvaristák számára is ideális választás! Rendkívül békés halak, melyeket könnyen együtt tarthatunk kisebb razbórákkal, dániókkal, pontylazacokkal is. Kifejtetlen maximum 6 cm-es testhosszt érnek el, egy pár számára egy 70 literes akvárium már elegendő.

Érdemes legalább párban gondozni, de ha kisebb csoportot szeretnénk, akkor valamivel nagyobb akváriumot válasszunk. Félénk halak, a nap nagy részében inkább a vízinnövények között mozognak. Akváriumuk kerüljön nyugodt helyre, lehetőleg ne tegyük ki intenzív napsugárzásnak sem. A vízinnövényzet legyen dúsan ültetett, és helyezzünk be úszónövényeket is.

A tompított világítás elősegíti, hogy halaink biztonságban érezzék magukat. A növények között ágakkal, sziklákkal dekorálhatunk – a morgó gurámik szívesen bújnak meg nagyobb gyökerek alatt vagy sziklák árnyékában is. Ha a morgó gurámikat nagyon intenzíven mozgó, aktív halakkal társítjuk, könnyen háttérbe szoríthatják őket, ezért nyugodt társhalak ajánlottak. Ideális választás melléjük egy csapat ékfoltos razbóra vagy üvegharcsa. Ha biztonságban érzik magukat, akkor sokkal többet mutatkoznak az akvárium előterében.

Élőhelyén rendkívül változatos környezethez szokott, kisebb kanálisok, tavak, árterületek és mocsárvidékek is mind otthon adnak számukra. Az átlátszótól az ún. fekete vízig sokféle biotópban előfordul. Sok helyütt gyorsan felmelegedő, oxigénszegény vízhez szokott, akváriumban is tágtűrésűnek bizonyul. Hosszú távú tartásához a 25-26 °C alkalmas, de a nyári melegekben a 30 °C-t is jól viseli.

Inkább a savanyú kémhatású vizet kedveli, 6-7 pH-n gondozhatjuk, lágy-középkemény vízben. A kereskedelembe hozzáférhető egyedek többsége jól alkalmazkodott a csapvizetes tartáshoz is. A részleges vízcserék tekintetében az általános ajánláshoz tartunk magunkat, ha kéthetente 20%-ot lecserélünk, az a morgó gurámiknak is megfelelő. Az akvárium aljára bátran szórjunk néhány marék falevelet – ez

búvóhelyül is szolgál a halaknak, de segít a vizet enyhén savanyítani, s nem utolsó sorban élethűbb körülményeket varázsol. Az áramlás a medencében legyen csekély.

A morgó gurámik a természetben szinte kizárólag állati eredetű táplálékot fogyasztanak, mint például vízre hulló apró rovarokat, szúnyoglárvákat, férgeket és más gerincteleneket. Akváriumban általában gyorsan hozzászoknak a száraz eleségekhez (tenyésztett példányoknál pedig a szoktatás sem jelent gondot), amik fő táplálékként adhatóak. Érdekes azonban rendszeresen élő és/vagy fagyasztott táplálékot is felkínálni nekik, úgy, mint artémiát, kandicsrákot, szúnyoglárvát. Tenyésztani csak a jól tartott példányokat lehet!

Tenyésztése nem a legkönnyebb a gurámifélék között. Ívási időszakban a hímek díszesebbek lesznek, egyúttal temperamentumosabbak is, sőt hallható hangokat hallatnak. A habfészket a hím építi úszónövények közé. A szaporítani kívánt párt tegyük ki egy tágasabb tenyészakváriumba, melybe sok vízinövényt helyezünk el, köztük finomabb szerkezetű úszónövényeket is. A medencét lágy és meleg, enyhén savanyú vízzel töltsük meg. Az ívás a habfészkek alatt zajlik, a hím testével körülöleli a nőtényt, kipréseli belőle az ikrákat, majd a szája segítségével a habfészkekbe gyűjti azokat.

A kelési idő kb. 2 nap, további 3-4 nap az elúszásig tartó időszak. Ez alatt az ivadékok a habfészkekben maradnak és felélik szikzacskójuk tartaléktápanyagát. A hím mindvégig őrzi a habfészket, de ha elég tágas a medence és van benne búvóhely, akkor a nőténnyel szemben jellemzően nem lesz túlságosan agresszív, az anya bent maradhat az akváriumban az elúszásig. Amikor a kishalak szabadon úsznak, mindkét szülőt távolítsuk el. A kishalak infuzóriával, kerekeshéreggel indíthatóak, pár nap múlva már az artémia naupliákat is képesek elfogyasztani.

Eleinte érzékenyek a vízminőség megváltozására, gyakori, de csak kis térfogatot érintő vízcserék javasoltak. A nevelő akváriumban egyenletes hőmérsékletet kell biztosítani, erre a cserevíznél is ügyeljünk! A tető is záródjon pontosan, hogy a labirintszerv gond nélkül fejlődhesen.

Magyar nevét arról kapta, hogy képes hallható hangokat produkálni, ezt főleg a hímek teszik párzási időszakban. Hangja morgó, kerregő.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Trichopsis vittatus*, *Trichopsis harrisi*, *Trichopus striatus*, *Osphromenus vittatus*, *Ctenops vittatus*.

Eng: Croaking gourami, Talking gourami.

Egyéb köznevei: Knurrender Gurami, Großer Knurrender Gurami, _____

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Morgó gurámi](#), [Akváriumi halak](#), [Trichopsis vittata](#), [akvarisztika](#), [1831](#), [Cuvier](#), [Belontiidae](#), [Mászó- és Labirinthalak](#)

JELLEMZŐK:

[fekete vízi](#), [állóvízi](#), [Dél-Kína](#), [barna vízi](#), [Indokína](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Ázsia](#), [Vietnám](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Dél-Ázsia](#), [Nagy-Szunda-szk](#), [átlátszó vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [Indonézia](#), [Myanmar](#), [lassan mozgó vízi](#), [alsó szint](#), [Szumátra](#), [bújós](#), [felső szint](#), [békés viselkedés](#), [Thaiföld](#), [Jáva](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [igenlágynvízi \(0-5°Nk\)](#), [sárga vízi](#), [lassú mozgású](#), [lágynvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Borneó](#), [ragadozó](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**
- Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**
- <https://www.seriouslyfish.com/species/trichopsis-vittata/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-09-06 08:59:18

Katalógus ID: 4261

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopolytus-halak/trichopsis-vittata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva