

Tropheus duboisi - Fehérpettyes bábasügér

| | |
|---------------|------------------------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Marlier, 1959 |
| CSALÁD: | Cichlidae |
| MÉRET: | 12-15 cm |
| C°: | 25-26 |
| pH°: | 7-8 |
| Nk°: | 10-20 |
| HELYIGÉNY: | 550 liter |
| VISELKEDÉS: | rajhal |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő, elsősorban vegetáriánus |
| TARTÓZKODIK? | középső-felső |
| ÉLETTARTAM: | 8-10 év |
| TERM.VÉD.: | nem értékelt |



Tropheus duboisi
Fehérpettyes bábasügér
(Marlier, 1959)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Tropheus duboisi – Fehérpettyes bábasügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Magas homlokú, karcú sügér faj. Rengeteg színváltozata van forgalomban, az egyik leggyakoribb kékesfekete alapszínű egy fehér kontrasztos sávval.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Amit egy dél-amerikai sügèresnek egy diszkoszhal jelent, egy afrikai sügèresnek azt jelenti egy Tropheus tartása. Legendás, vagy hogy úgy mondjam híres-hírhedt hal... Egy biztos, nem kezdőknek valók, viszont gyakorlottabb akvaristák páratlanul pazar sügérvilágot alkothatnak velük. Több lehetséges egyberakási módszer van. Az egyik, melyben 1 hím 2-3 nősténnyel tartunk, ez aránylag stabil az agresszió szempontjából, viszont ha netán a hím elhullik, vagy akármelyik nőstény, akkor pótlásuk nehéz egy összeszokott hárembe. Tarthatjuk úgy 8-12 fős csapatban is, de így meglehetősen sérülékeny a pillanatnyi helyzetük. Bármikor kitörhet agresszió, több hím esetében pláne, a hierarchikus rend megoszlása sem a legjobb így, és a relatíve kevés hal között nem jól oszlik meg az agresszió. Esetleges elhulláskor a rendszer könnyen felborulhat. Minden szempontból stabil egy akár 30 fős csoport gondozása. Nem olcsó hal, így akár kisebb vagyon is lehet (variánsfüggő persze) egy ekkora csoport gondozása, de aki nem elég tapasztalt, valószínűleg annak ez a legjárhatóbb út, és ezt egy 550-750 literes medencében könnyedén kivitelezheti. Így az állomány magatartása, hierarchiája 1-1 példány elhullásával is stabil marad, és kezelhetőbbek a példányok. Tapasztalt akvaristák persze jól tudnak kezelni kisebb csoportot is akár, de általában leginkább az utóbbi módszer a helyálló, ezt neves sügérentyész is megerősítette már.

Alaposan szűrt, kristálytisza, bomlástermékmentes és oxigéndús vizet igényelnek! Lehetőleg egyfajos módon gondozzuk, esetleg néhány talajlakó társaságában. Különösen értelmes sügér faj. Anubiasokkal dekorálhatunk és néhány követ helyezhetünk még be, de nagy nyílt teret igényelnek az úszáshoz.

Etetésükre nagyon érzékenyek, kaphatóak a kereskedelemben speciális Tropheus-tápok, elsősorban a szárazzeleségek közül azokat alkalmazzuk, valamint kaphatóak fagyasztott Tropheus-mixek is. A különféle Tropheus-mixek összetevőit külön-külön is adagolhatjuk általában. Forrázott zöldséget is kaphatnak, de lehetőleg saját termesztésű legyen, 100%-osan vegyszermentes! Szigorúan tilos vörös szúnyoglárvával, tubifexszel etetni érzékeny bélrendszerük miatt. A természetben is apró rákocskákkal, de leginkább algákkal és növényi eredetű táplálékokat fogyasztanak.

Lugos, meleg vízben ívathatóak, anyai szájköltők. Az ikrák nyílt vízi ívásból potyognak szerteszét, a nőstény külön keresi meg őket. A kb. egy hónapig tartó szájkubáció alatt a nőstény táplálkozik. Csak kevés, 5-15 kishal várható, amik sórákkal indíthatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: White Spotted Cichlid.

Egyéb köznevei: Brabantcichlide, Dwarf Tanganyikan cichlid, Vyökeisari, Vyökirjoahven, Weißpunkt-Brabantbuntbarsch.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Akváriumi halak](#), [Fehérpettyes bábasüger](#), [akvarisztika](#), [1959](#), [Marlier](#), [Tropheus duboisi](#)

JELLEMZŐK:

[lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [Kelet-Afrika](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Tanganyika-tó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [növényevő](#), [átlátszó vízi](#), [békés rajhal](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Afrika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-29 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:37:23

Katalógus ID: 4433

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/tropheus-duboisi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva