

Tropheus moorii - Napsugár bábásügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1898
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	13 cm
C°:	24,0-26,0
pH°:	8,0-9,0
Nk°:	9,0-19
HELYIGÉNY:	650 liter
VISELKEDÉS:	harcias, területvédő
TÁPLÁLÉK:	növényevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-10 év
TERM.VÉD.:	



Tropheus moorii
Napsugár bábásügér
(Boulenger, 1898)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

TOVÁBBI KÉPEK:



Képek feltöltés alatt!

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

A Tanganyika-tó algákkal fedett köves vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal színe általában barnásfekete, sárga, fehér vagy rozsdaszínű keresztsávokkal. A fiatalok fekete testén fehér foltok vannak. Az alsó állású száj alkalmas az algák és a rovarlárvák lecsipegetésére a kövekről.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Számos színváltozata ismert.

Tartását tekintve a vélemények megoszlanak. Egy biztos, a bábásügérek (Tropheus sp.), az afrikai

sügéresek "diszkoszai", mivel nehezen tarthatóak.

A nagy akváriumméret indoka:

Érdemes egy ilyen nagy medencében (500-650 liter) tartani, és méghozzá kb. 30 egyedes csapatban! Bár drága halak, mégis a legjobb módszer, ha nagy csapatban tartjuk, mert így folyamatos agressziót és egyéb más problémákat küszöbölhetünk ki!

Lehet kisebb medencében 1 hím 3 nőstény arányban tartani, de alapvetően csapatosak.

Lehet kb. 10-15 fős csapatban is tartani, de ez még nem is túl sok, de nem is túl kevés, viszont így több gonddal kell majd szembenéznünk, mint egy nagy csapat esetén.

Egy beállt csapatba új példányt telepíteni nem szabad! A hímek nem kedvelik egymást, de több példány esetén nagy csapatban tartva ezen agresszió oldódik. Más sügérekkel aránylag jól társítható, de nem szokás. Csak egy színváltozat példányait gondozzuk!

Alaposan szűrt, kristálytisza, bomlástermékmentes és oxigéndús vizet igényelnek! Lehetőleg egyfajson módon gondozzuk, esetleg néhány talajlakó társaságában. Különösen értelmes sügér faj. Anubiasokkal dekorálhatunk és néhány követ helyezhetünk még be, de nagy nyílt teret igényelnek az úszáshoz.

Etetésükre nagyon érzékenyek, kaphatóak a kereskedelemben speciális Tropheus-tápok, elsősorban a szárazzeleségek közül azokat alkalmazzuk, valamint kaphatóak fagyasztott Tropheus-mixek is. A különféle Tropheus-mixek összetevőit külön-külön is adagolhatjuk általában. Forrázott zöldséget is kaphatnak, de lehetőleg saját termesztésű legyen, 100%-osan vegyszermentes! Szigorúan tilos vörös szúnyoglárvával, tubifexel etetni érzékeny bélrendszerük miatt. A természetben is apró rákocskákkal, de leginkább algákkal és növényi eredetű táplálékokat fogyasztanak.

Lugos, meleg vízben ívathatóak, anyai szájköltők. Az ikrák nyílt vízi ívásból potyognak szerteszét, a nőstény külön keresi meg őket. A kb. egy hónapig tartó szájkubáció alatt a nőstény táplálkozik. Csak kevés, 5-15 kishal várható, amik sórákkal indíthatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Tropheus moorii moorii*.

Eng: Blunt-Headed Cichlid, Blunthead cichlid, Brabant cichlid, Dwarf Tanganyikan cichlid.

Egyéb köznevei: Saddelpletcichlide, Moorii, Keisarikirjoahven, Brabantbuntbarsch.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Napsugár bábasüger](#), [Tropheus moorii](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [1898](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:26:18

Katalógus ID: 4235

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/tropheus-moorii.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva