

Xenotoca eiseni - Eisen fogasponty

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rutter, 1896
CSALÁD:	Goodeidae
MÉRET:	6-8 cm
C°:	18-24
pH°:	6-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	kissé harcias
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Xenotoca eiseni
Eisen fogasponty
(Rutter, 1896)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Xenotoca eiseni – Eisen fogasponty elterjedési területe (Map)



Folyók és patakok a Mexikói-fennsíkon (Rio Grande de Santiago).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal faroknyelén ragyogó narancssárga és vörös foltok láthatók, melyek a hímeken élénkebbek. Színe a hátúszó előtt sárgásbarna, máshol fémes kékeszöld. A hím farok alatti úszóján bemetszés látható, hátúszója gyakran eléggé nagy és lekerekített. Az alsó állkapocs és a toroktájék rózsaszín lehet.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Civakodó, úszócsipkedő hal hírében áll. A közepes keménységű vizet kedveli.

Érdemes csak nagyobb testű, robosztusabb fajokkal vagy egymagában tartani, nem társas medencébe való. Nagyobb termete miatt nem árt, ha viszonylag nagy medencébe helyezzük. Erősebb szűrést célszerű neki biztosítani, mivel a tiszta vizet kedveli.

Átlagos növényesítésű medencében jól érzi magát, ágakkal dekoráljunk. Úszónövényt is használhatunk.

Egymagában tartva csapatot telepítsünk, így színeik jobban kijönnek és egymagukban, esetleg néhány talajlakó mellett, is nagyon színpompásak lesznek. Ha hasonló vagy nagyobb robosztus fajokkal telepítjük egybe, akkor még kezelhető viselkedésű lesz (pl. nagyobb márnák (everett-márna, farkszalagos márna, stb.), meggyhasú sügér, csókos gurámi, tányérlazac), de kisebb halakkal szemben agresszíven csipkelődik, és a fátyolos úszójú halakat sem kíméli.

Alapvetően igénytelen hal, kezdők is tarthatják.

Kapjon néha élő eleségeket és forrázott zöltséget egyaránt. Akváriumban száraz tápokat is elfogad, de hosszútávon mindenképpen kell gondoskodni kiegészítő zöldeléségről, és például fagyasztott szúnyoglárváról is, ami nagy kedvencük.

Elevenszülő, tenyésztése nem nehéz. Kb. két havonta szül 10-20 ivadékot, amik viszonylag nagyok, így könnyen nevelhetőek.

Az egyik legismertebb és leggyakoribb Goodeidae magashegyi fogasponty a hazai akvarisztikában.

Sokan még csak változatának tartják a *Xenotoca* sp. San Marcos-t, azonban ez egy mindezidáig leíratlan, külön fajnak minősül a legfrissebb kutatási eredmények szerint. Ez egyébként színezetében nagyon hasonlít e fajhoz, talán még csillogósabb és élénkebb, nem sok különbséggel, azonban magatartásban inkább, ő egy békésebb faj, az eredeti, visszavezethető leszármazású *Xenotoca eiseni* különösen csipkelődős, már-már összeférhetetlen halak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Characodon eiseni* .

Eng: Orangetail goody, Redear goodeid, Redtail splitfin.

Egyéb köznevei: Rddhalet goodeide, Punapyrstötoka, Toka, Eisens-Kärpfling, Ksenotoka, Mexcalpique cola roja.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[1896](#), [Eisen fogasponty](#), [Akváriumi halak](#), [Rutter](#), [akvarisztika](#), [Xenotoca eiseni](#), [Elevenszülő halak](#), [Goodeidae](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [magashegyi](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Amerika](#), [felső szint](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Közép-Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos növényzetigényű](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [kissé agresszív viselkedés](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-20 08:42:26

Katalógus ID: 3917

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/xenotoca-eiseni.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva