

Yasuhikotakia morleti - Csapatos díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Tirant, 1885
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	10 cm
C°:	26,0-30,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-16 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Yasuhikotakia morleti
Csapatos díszcsík
(Tirant, 1885)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Yasuhikotakia morleti – Csapatos díszcsík elterjedési területe (Map)

Thaiföld és Észak-India folyói, patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

E tökéletesen áramvonalas testű csík színe sárgásszürke, oldalának alsó része és a hasa világosabb, ezüstös árnyalatú. Hátoldalán egy sötét csík húzódik végig, faroknyelét is sötét sáv övezi. Pikkelyei nagyon kicsik, bőrének felszíne fénytelen. hátvonala ívelt, hasfala egyenletesen lapos, a farktő igen magas. Hosszúsága: 8-10 cm-t érhet el.

Szürkéssárga, zöldesen vagy kékesen csillogó alapon mindig ugyanúgy maradó hátszíj a gerincen, amely a farktőnél lefelé kanyarodik. Kétoldalt három vagy négy, igen változókéony keresztcsáv van, amelyek egészen el is tűnhetnek.

A *Botia* fajok alakja általában hosszúkás és esetlen, a hátvonaukl ívelt, a hasvonaluk viszont többé-kevésbé egyenes. Ebben a tekintetben azonban kétféle *Botia*-csoport különböztethető meg. Ezek egyikében viszonylag egyenes a fajok halvonala, a másik csoport fajainak hát- és hasoldala viszonylag egyformán ívelt. A faroknyél magas, sőt egyes fajoké igen magas. A fej hosszú és hegyes, a száj vég-, ill. alsóállású. A fejen magasan elhelyezkedő szemeket nem védi hártya, mint néhány más csíkfélékét. A szem alatti tövis kéthegyű, felegyenesíthető, s záróizülete van. Kétoldalt 3—3 bajuszszál látható. A pikkelyek nagyon visszafejlődtek. Az úszóhólyag csontos tokba van zárva.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Botia* nembe csupa olyan halfaj tartozik, amelyek egyesével tartva könnyen marakodóvá válnak. Gondozásukban ne hagyjuk magunkat félrevezettetni attól, hogy mivel a csíkfélék gyakran iszapos vizek lakói, azért elmulmosodott (eliszaposodott) medencékben is tarthatók. Éppen ellenkezőleg: kedvelik a kristálytisza, oxigénben gazdag, nem túlságosan meleg vizet és a tiszta kavicstalajt.

A *Botia* fajok többé-kevésbé territoriális viselkedésűek; ami azonban nem zárja ki, hogy időnként ne éljenek — rendszerint nem túl nagy — rajokban. Sok faj határozottan hallható pattintó hangot ad, amely két versengő állat közül rendszerint az erősebbtől származik. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudjuk, hogy hasonló hangoknak a szaporodásban is van-e szerepük:

A *Botia* fajok egyedei szívesen tartózkodnak üregekben, vagy egészen befúrják magukat a talajba, de ebben a tekintetben nem minden faj viselkedik egyformán. Akváriumban kókuszdióhéjak laposan felfekvő részei nagyon jól beváltak rejtekhelyekként. Ha nincsenek üregek, az állatok saját maguk készítene fedezéket kövek vagy más díszítő elemek alá. Különösen a frissen telepített példányok ilyenkor több napig nem mutatkoznak.

A természetben ezek a csíkfélék feltehetőleg az áramlással (fejfel) szembeállnak, s várják az odasodródó táplálékot, miközben csupán megnyúlt felső ajkuk és bajuszszálaik látszanak ki a leshelyből. Táplálékuk valószínűleg apró víziállatok és szerves hulladékok. Akváriumban szárazzeleséget is elfogadnak, de a társas tartásnál arra kell ügyelni, hogy az eleség valóban lejusson a fenékre. Jó szolgálatokat tesznek az esetleges maradékok elfogyasztásában. Nagyon kedvelik az eleségtablettákat is.

Fajtársaikkal, vagy ha ilyenek nincsenek, más halakkal szemben is nagyon összeférhetetlenül viselkedhetnek. Célszerű vagy különböző fajok egyedeit egy-egy példányban, vagy ugyanazon faj egyedeit nagyobb egyszámban tartani. Azonos fajhoz tartozó két-három példány esetleg könnyörtelenül megtámadja egymást, s az erősebb elpusztítja a gyengébbeket.

A víz hőfokát illetően nem olyan igényesek, mint általában gondolják. A hőmérséklet esetenként elérheti ugyan a 28 C°-ot, de 24—25 C° valószínűleg nemcsak elegendő, hanem — úgy látszik — megfelelőbb is.

Viszonylag kicsiny és békés faj, amely éppen ezért társas tartásra alkalmas. A csapatos díszcsík nappal a növényzet között pihen.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Botia horae*, *Botia morleti*.

Eng: Skunk botia, Cream loach, Mouse loach, Skunk loach, Hora's Loach.

Egyéb köznevei: Musebotia, Horae, Kaarinuoliainen, Aalstrich-prachtschmerle, Aalstrichschmerle, Horas Schmerle, Mausschmerle, Trey kanchrouk.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Tirant](#), [Yasuhikotakia morleti](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Akváriumi halak](#), [1885](#), [akvarisztika](#), [Csapatos díszcsík](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Indokína](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [India](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Myanmar](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassú mozgású](#), [bújós](#), [alsó szint](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [békés viselkedés](#), [barna vízi](#), [lágylvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Thaiföld](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2016-06-01 06:33:58

Katalógus ID: 4269

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/yasuhikotakia-morleti.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva